Инструкция по применению
Лакрисифи капли глазные 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Италия
Производитель: НОВАМЕДИКА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бензалкония хлорид+Гипромеллоза
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5 мг+100 мкг/1 мл
Срок годности: 48.0

Действующее вещество

Бензалкония хлорид+Гипромеллоза

Состав

Гипромеллоза - 0,005 гБензалкония хлорид - 0,0001 гВспомогательные вещества: натрия фосфат однозамещенный; натрия фосфата двузамещенного додекагидрат; натрия эдетат; натрия хлорид; вода очищенная

Форма выпуска

Капли

Показания

Недостаточное слезоотделение;лагофтальм;деформация век;эктропион;состояние после пластических операций на веках или после хирургических операций на роговице и конъюнктиве;эрозия и трофические язвы роговины;состояние после термических ожогов роговицы и конъюнктивы;буллезные дистрофические изменения роговицы;кератопатия;микродефекты роговичного эпителия;состояние после кератопластики, кератэктомии;необходимость пролонгации действия или снижения раздражающего действия других глазных капель;комбинированное лечение синдрома «сухих глаз»;синдром Шегрена;ксероз;кератоз (часто - в сочетании с терапевтическими контактными линзами);раздражение глаз, вызванное дымом, пылью, холодом, ветром, солнцем, соленой водой, при аллергии;проведение диагностических процедур (гониоскопия, электроретинография; электрокоагулография, УЗИ).

Способ применения и дозы

В конъюнктивальный мешок. По 1–2 капли 4–8 раз в день.Не следует превышать рекомендуемую дозу.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата;острые воспалительные и инфекционные заболевания передней камеры глаза.С осторожностью: острая фаза химического ожога роговицы и конъюнктивы (до полного удаления токсичных веществ и некротизированных тканей).

Применение при беременности и кормлении грудью

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности, кормления грудью нет. Возможно применение Лакрисифи для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Побочные действия

Аллергические реакции, неприятное чувство склеивания век (из-за большой вязкости раствора), ощущение жжения, раздражение.Развитие аллергических реакций возможно при длительном использовании Лакрисифи. В этом случае следует прекратить лечение препаратом и назначить соответствующую терапию.

Передозировка

Данных о случаях передозировки препарата Лакрисифи нет.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат несовместим с глазными каплями, содержащими соли металлов.

Особые указания

Препарат не рекомендуется использовать при ношении контактных линз. Перед его применением следует снять контактные линзы и снова надеть их не ранее чем через 20–30 мин.Достаточного опыта по применению препарата у детей нет. Возможно применение Лакрисифи для лечения детей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.В виду возможного слезотечения после закапывания препарата не рекомендуется применять его непосредственно перед управлением транспортными средствами или обслуживанием механического оборудования.Препарат применяется только в офтальмологической практике; не рекомендуется длительное его использование. Отсутствие эффекта в течение короткого промежутка времени требует консультации офтальмолога.

Срок хранения после открытия

28.0

Условия хранения

Беречь от детей