Инструкция по применению
Лактаза Бэби Капсулы 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Deerland Probiotics & Enzymes
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

ЛактазаБэби - Биологически активная добавка (БАД) к пище - ферментный препарат. Дополнительный источник фермента лактазы с целью улучшения усвоения молочных продуктов.Прием препарата Лактаза Бэби быстро купирует симптомы дефицита лактазы, улучшая качество пищеварения.Прием препарата помогает малышам эффективнее переваривать грудное молоко, уменьшая вздутие живота, ликвидируя детские колики.

Состав

Мальтодекстрин, оболочка капсулы (загуститель –гидроксипропилметилцеллюлоза), фермент лактаза (мальтодекстрин, фермент лактаза (продуцент – Aspergillus oryzae), хлорид натрия), порошок среднецепочечных триглицеридов жирных кислот (МСТ).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище источника фермента лактазы для детей с рождения до 7 лет.

Способ применения и дозы

При лактазной недостаточности. 1 капсула на 100 мл молока или молочной смеси (учитывается весь объем кормления). Перед применением вскрыть капсулу и растворить содержимое капсулы в молоке или молочной смеси. Использовать в каждое молочное кормление. Для детей до 1 года, находящихся на грудном и/или смешанном вскармливании: перед кормлением сцедить 5-10 мл молока, высыпать в него содержимое капсулы, перемешать в течение 2-3 минут, начать кормление, при необходимости докормить грудью. Для детей до 1 года на искусственном вскармливании: содержимое капсулы добавить непосредственно в теплую (температура до 37-39°С) готовую молочную смесь, тщательно перемешать и приступить к кормлению. При необходимости увеличить дозировку, но не более 4 капсул на кормление. Детям от 1 до 7 лет использовать от 1 до 5 капсул с пищей, содержащей молочные продукты или лактозу. Детям до 5 лет содержимое капсулы добавить в теплое (до 37-39°С) молоко или в подогретую пищу (до 37-39°С), содержащую молоко, тщательно перемешать и приступить к кормлению. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением БАД детьми следует проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям до 7 лет принимать продукт по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.

Применение при беременности и кормлении грудью

Перед применением следует проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Перед применением следует проконсультироваться с врачом-педиатром.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше +25оС.