Инструкция по применению
Лактазар Капсулы для детей 700 ЕД 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 700 ЕД
Срок годности: 24.0



Описание

ЛАКТАЗАР® за счёт лактазы в составе мягко воздействует на истинную причину неприятных симптомов при лактазной недостаточности.

Состав

Наполнитель мальтодекстрин - 0,1355 г, фермент лактаза - 0,013 г, скользящее вещество среднецепочечные триглицериды - 0,0015 г; желатин, красители: титана диоксид, хинолиновый желтый (капсула твердая желатиновая). 1 капсула содержит не менее 700 единиц фермента лактазы.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

ЛАКТАЗАР® для детей рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника фермента лактазы, недостаток которого обычно проявляется: повышенным газообразованием, коликами, неустойчивым стулом (диарея, запор). Недостаток собственного фермента наиболее часто встречается у детей первого года жизни с младенческими коликами, у большинства недоношенных и маловесных детей, также у детей во время или после кишечных расстройств и при врожденной лактазной недостаточности. Прием фермента лактазы позволяет сохранить грудное вскармливание и устранить причину колик в случае недостатка фермента в кишечнике. Проведенные ГУ НИИ питания РАМН клинические исследования ЛАКТАЗАР® для детей показали, что у детей в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев с проявлениями недостатка собственного фермента (колики, вздутие, неустойчивый стул) применение ЛАКТАЗАР® для детей приводило к устранению проявлений функциональных нарушений пищеварения.

Способ применения и дозы

ЛАКТАЗАР® для детей применяется из расчета 1 капсула на 100 мл молока или молочной смеси. ЛАКТАЗАР® для детей давать ребенку в каждое молочное кормление. Перед применением капсулу необходимо вскрыть и растворять в молоке или молочной пище только содержимое капсулы. Дети до 1 года на грудном и смешанном вскармливании Перед кормлением сцедить 5-10 мл молока. Высыпать в молоко содержимое капсулы, перемешать в течение 2-3 минут. Начать кормление с этой порции, затем докормить из груди. Дети до 1 года на искусственном вскармливании Содержимое капсулы добавить непосредственно в теплую (до +37 °С) готовую молочную смесь, тщательно перемешать, через несколько минут приступить к кормлению. Дети от 1 до 5 лет Содержимое капсулы добавить в теплое (до +37 °С) молоко или в подогретую пищу (до +37 °С), содержащую молоко, тщательно перемешать, через несколько минут приступить к кормлению. Дети от 5 до 7 лет Содержимое капсулы добавить в теплое (до +37 °С) молоко или в подогретую пищу (до +37 °С), содержащую молоко, тщательно перемешать, через несколько минут приступить к приему пищи. Взрослым и детям старше 7 лет по 1 капсуле при приеме молока или пищи, содержащей молоко, молочные продукты или углевод лактозу.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением следует проконсультироваться с врачом-педиатром.

Срок хранения после открытия

2 года.

Условия хранения

В сухом месте