Инструкция по применению
Лактонорм Капсулы вагинальные 100 млн КОЕ 14 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Лекко
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лактобактерии ацидофильные
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 100 млн КОЕ
Срок годности: 24.0

Описание

Твердые желатиновые прозрачные капсулы, которые содержат внутри порошок от белого до светло-коричневого цвета с возможными вкраплениями

Действующее вещество

Лактобактерии ацидофильные

Состав

Одна капсула препарата содержит активное действующее вещество: живые ацидофильные лактобактерии не менее 108 КОЕ, вспомогательные вещества: магния стеарат -3,00 мг, лактозы моногидрат - достаточное количество до получения массы содержимого капсулы 400,0 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Лечение и профилактика вагинальных дисбиозов.Комплексное лечение: острых, подострых, хронических вульвитов и вагинитов, постменопаузального атрофического вагинита, бактериального вагиноза после проведения антибактериальной терапии. Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений, дисбиотических изменений урогенитального тракта на фоне антибактериальной терапии. Подготовка к проведению плановых гинекологических операций и предродовая подготовка беременных женщин, входящих в группу риска в отношении воспалительных заболеваний.

Способ применения и дозы

С лечебной целью: 1 вагинальная капсула 2 раза в день (утром и вечером) в течение 7 дней. В случае необходимости курс лечения может быть продлен. С профилактической целью: 1 вагинальная капсула 1 раз в день на ночь в течение 7-14 дней. Лечение и/или профилактику следует проводить сразу после менструации.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Не рекомендуется применять при симптомах вульвовагинального кандидоза («молочницы»).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат можно использовать в период беременности и грудного вскармливания

Побочные действия

При применении в рекомендуемых дозах побочные действия не обнаружены. В редких случаях возможно появление аллергических реакций

Передозировка

Случаи передозировки не зарегистрированы

Взаимодействие с другими препаратами

Лактонорм может быть использован в сочетании с другими лекарственными средствами. Применение препарата возможно после местного введения антибактериальных препаратов и/или антисептиков.

Особые указания

После введения капсулу из влагалища извлекать не следует, т.к. она предназначена для одноразового применения. Препарат не следует применять перед половым актом. Капсула может быть введена после полового акта и туалета наружных половых органов.Применение у пациентов младше 18 лет возможно по рекомендации врача с учетом характера заболевания и индивидуальных особенностей

Срок хранения после открытия

2 года. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В сухом месте