Инструкция по применению
Лактоструктум таблетки 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Витамер
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50



Описание

Лактоструктум очищает организм от токсинов, аллергенов и патогенных бактерий. В его состав входят лигнин и лактулоза, два натуральных действующих вещества. Лигнин - энтеросорбент природного происхождения, обладает сорбирующей активностью и способствует выведению из организма аллергенов, токсинов, ядов и химических соединений. Лактулоза является природным пребиотиком, нормализует работу кишечника, восстанавливает микрофлору. Эффективен при алкогольных, пищевых, лекарственных отравлениях. Не раздражает слизистую желудка и кишечника. Производится российской компанией "Витамер" в соотвествии с принципами ХАССП (HACCP).

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция компонентов лактулозы слабая - до 3%. Лигнин не всасывается и выводится из кишечника в течение 24 часов.

Способ применения и дозы

Внутрь, при необходимости после предварительного измельчения, запивая водой, за час до еды и приема других лекарственных средств. При дисбактериозе кишечника: взрослым и детям старше 12 лет - по 2-3 таблетки 3 раза в день, - детям от 8 до 12 лет - по 1-2 таблетки 3 раза в день, детям от 3 до 7 лет - по 1 таблетке 3 раза в день, детям от 1 года до 3 лет - по 1/2 таблетки 3 раза в день. При бактериальном вагинозе (дисбиозе влагалища): По 2 таблетки 3 раза в день. Средняя продолжительность курса лечения - 2-3 недели. Длительное использование препарата и повторные курсы лечения должны проводиться только по рекомендации врача.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препарата, непроходимость кишечника, желудочно- кишечные кровотечения, галактоземия. Нежелательно использовать препарат при обострении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, атонии кишечника.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата, редко - метеоризм, диарея.

Передозировка

Симптомы: запор, боли в животе. Лечение: прекращение приема препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно снижение лечебного эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь препаратов.

Условия хранения

от 5.0°C до 25.0°C