Инструкция по применению
Лактулоза-Озон Сироп 667 мг/мл 200 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лактулоза
Количество в упаковке: 200



Описание

Прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до слегка желтоватого или коричневато-желтого цвета. Характеристика препарата: Препарат Лактулоза представляет собой сироп, оказывающий слабительное действие. Лактулоза является синтетическим производным лактозы. Не распадается в желудке и в тонком кишечнике из-за отсутствия соответствующих ферментов и практически не всасывается. Попадая в кишечник, стимулирует перистальтику, улучшает всасывание фосфатов и солей кальция, увеличивает диффузию аммиака из крови в кишечник и способствует его выделению из организма.

Действующее вещество

Лактулоза

Состав

Препарат Лактулоза содержит: Действующим веществом является лактулоза. 1 мл препарата содержит лактулозу жидкую эквивалентную 667,0 мг лактулозы. Прочим ингредиентом (вспомогательным веществом) является вода очищенная.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Препарат Лактулоза применяется у взрослых и детей без возрастных ограничений при: запоре: регуляция физиологического ритма опорожнения толстой кишки, размягчении стула в медицинских целях (геморрой, состояния после операции на толстой кишке и в области анального отверстия), печеночной энцефалопатии у взрослых: лечение и профилактика печеночной комы или прекомы. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза для взрослых Доза при лечении запора или для размягчения стула в медицинских целях Суточную дозу лактулозы можно принимать однократно, либо разделив ее на две, используя мерную ложку. Через несколько дней начальная доза может быть скорректирована до поддерживающей дозы в зависимости от реакции на прием препарата. Слабительный эффект может проявиться через 2-3 дня после начала приема препарата. Возраст Начальная суточная доза Поддерживающая суточная доза Взрослые 15-45 мл 15-30 мл Доза при лечении печеночной энцефалопатии Для приема внутрь: Начальная доза: 3-4 раза в день по 30-45 мл. Затем переходят на индивидуально подобранную поддерживающую дозу так, чтобы мягкий стул был максимально 2-3 раза в день. Для ректального введения: В случае прекоматозного состояния или состояния комы препарат может быть назначен в виде клизмы с удержанием (300 мл препарата/700 мл воды). Клизму следует удерживать в течение 30-60 минут, процедуру следует повторять каждые 4-6 часов, до тех пор, пока не станет возможным назначение препарата перорально. Применение у детей и подростков Доза при лечении запора или для размягчения стула в медицинских целях Суточную дозу лактулозы можно принимать однократно, либо разделив ее на две, используя мерную ложку. Через несколько дней начальная доза может быть скорректирована до поддерживающей дозы в зависимости от реакции на прием препарата. Слабительный эффект может проявиться через 2-3 дня после начала приема препарата. Возраст Начальная суточная доза Поддерживающая суточная доза Подростки 15-45 мл 15-30 мл Дети 7-14 лет 15 мл 10-15 мл Дети 1-6 лет 5-10 мл 5-10 мл Дети до 1 года до 5 мл до 5 мл Безопасность и эффективность препарата Лактулоза у детей и подростков от 0 месяцев до 18 лет с печеночной комой и пре комой на данный момент не установлены. Данные отсутствуют. Особые группы пациентов Пациенты пожилого возраста Клинические исследования лекарственного препарата Лактулоза у пожилых пациентов не проводились. Особый риск для пациентов пожилого возраста не

установлен. Нет специальных рекомендаций по дозированию, так как системное воздействие лактулозы незначительно. Пациенты с печеночной недостаточностью Клинические исследования лекарственного препарата Лактулоза у пациентов с печеночной недостаточностью не проводились. Особый риск для пациентов с печеночной недостаточностью не установлен. Нет специальных рекомендаций по дозированию, так как системное воздействие лактулозы незначительно. Пациенты с почечной недостаточностью Клинические исследования лекарственного препарата Лактулоза у пациентов с почечной недостаточностью не проводились. Особый риск для пациентов с почечной недостаточностью не установлен. Нет специальных рекомендаций по дозированию, так как системное воздействие лактулозы незначительно. Путь и (или) способ введения Препарат предназначен для приема внутрь, а также для ректального введения. Лактулозу рекомендовано принимать во время или после приема пищи. Препарат можно принимать как в разведенном, так и в неразведенном виде. Необходимо сразу проглотить принятую однократную дозу, не задерживая во рту. В случае назначения однократной суточной дозы, ее необходимо принимать в одно и то же время, например, во время завтрака. Для точного дозирования препарата следует использовать прилагаемую мерную ложку. Во время терапии слабительными средствами рекомендуется принимать достаточное количество жидкости, 1,5-2,0 л или 6-8 стаканов воды в день.

Противопоказания

Не применяйте препарат Лактулоза: если у Вас аллергия к лактулозе или к другим компонентам препарата, перечисленным в разделе 6 листка-вкладыша, если у Вас галактоземия (наследственное заболевание, при котором в организме не перерабатывается сахар галактоза), если у Вас непроходимость желудочно-кишечного тракта, нарушение целостности стенок кишечника или есть риск нарушения стенок кишечника, если у Вас непереносимость галактозы или фруктозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция. Сообщите своему врачу, если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, прежде чем использовать это лекарственное средство.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Лактулоза может использоваться во время беременности в случае необходимости. Лактация Лактулозу возможно применять у кормящих женщин в случае необходимости.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Побочные явления носят, как правило, слабовыраженный и обратимый характер, и являются следствием превышения дозы. В первые дни приема лактулозы возможно появление метеоризма. Как правило, он исчезает через несколько дней. В случае применения повышенных доз в течение длительного времени при лечении печеночной энцефалопатии могут развиться нарушения водно-электролитного баланса вследствие диареи. Сообщалось о следующих нежелательных реакциях при применении лактулозы (у взрослых и у детей). Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10) Диарея. Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10) Метеоризм, тошнота, рвота, боль в животе. Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100) Нарушение водно-электролитного баланса вследствие диареи. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Данная рекомендация также относится к любым нежелательным реакциям, не указанным в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли больше препарата Лактулоза, чем предусмотрено Если Вы приняли больше препарата чем должны, прекратите прием и обратитесь к врачу. У Вас может быть диарея и боль в животе. Если Вы забыли принять препарат Лактулоза Если Вы забыли принять препарат Лактулоза, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу. Если Вы перестанете принимать препарат Лактулоза Не прекращайте и не изменяйте лечение без консультации с лечащим врачом. При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите своему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты. Препарат Лактулоза с едой и напитками Препарат Лактулоза можно принимать во время или после приема пищи.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата Лактулоза не влияет или оказывает незначительное влияние на способность к управлению автомобилем и механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на этикетке флакона и картонной упаковке (пачке). Датой истечения срока годности является последний день данного месяца. Хранить при температуре не выше 25 °С.