Инструкция по применению
Лактулоза Авва Сироп 667 мг/мл 1000 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Авва Рус
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Лактулоза
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 667 мг/мл



Описание

Прозрачная вязкая жидкость, от бесцветного до желтого с коричневатым оттенком цвета.

Действующее вещество

Лактулоза

Состав

На 1 мл:Действующее вещество: лактулоза - 667 мг,Вспомогательные вещества: лимонная кислота - 0,5 мг, вода очищенная - до 1 мл.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Абсорбция низкая. Лактулоза всасывается из тонкой кишки только на 0,4-2%, затем доходит до толстого отдела кишечника, где расщепляется кишечной микрофлорой. Полностью метаболизируется при применении в дозах до 40-75 мл. При применении в более высоких дозах частично выводится в неизмененном виде.

Показания

Хронический запор, а также заболевания, требующие облегчения дефекации. Профилактика и лечение печеночной энцефалопатии у взрослых.

Способ применения и дозы

Внутрь. Независимо от приема пищи.Препарат Лактулоза можно растворять в воде и других жидкостях и принимать разбавленным.При хроническом запоре, а также заболеваниях, требующих облегчения дефекации суточную дозу можно принимать однократно, либо разделив ее на два приема, используя мерный стаканчик. Через несколько дней доза может быть скорректирована до поддерживающей дозы в зависимости от реакции на прием препарата.Возраст//Начальная суточная доза //Поддерживающая суточная дозаУ детей старше 14 лет и взрослых//15-45 мл//15-30 млУ детей от 6 до 14 лет//15 мл//10-15 млУ детей от 1 года до 6 лет//5-10 мл//5-10 млУ детей до 1 года//до 5 мл//до 5 млПри печеночной энцефалопатии дозу следует повышать постепенно.У взрослых, начиная с 7,5-15 мл 3-4 раза в день, увеличить до 30-45 мл 3-4 раза в день.Специальные рекомендации по дозированию препарата у пациентов пожилого возраста и пациентов с почечной и печеночной недостаточностью отсутствуют, так как системное воздействие лактулозы незначительно.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к лактулозе или другим компонентам препарата, кишечная непроходимость, непереносимость фруктозы, галактозы, дефицит лактазы, глюкозогалактозная мальабсорбция, галактоземия, ректальные кровотечения (причиной которых не является геморрой), подозрение на аппендицит, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости.

Побочные действия

Частота побочных эффектов классифицирована в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения: очень часто - не менее 10%, часто - не менее 1%, но менее 10%, не часто - не менее 0,1%, но менее 1%, редко - не менее 0,01%, но менее 0,1%, очень редко (включая единичные случаи) - менее 0,01%, частота неизвестна - недостаточно данных для оценки частоты явления в популяции. Со стороны питания и обмена веществ: очень редко - гипернатриемия, частота неизвестна - нарушения водно-электролитного обмена, которые возникают вследствие диареи.Со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, диарея.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, диарея, гипокалиемия, гипернатриемия.Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с диуретиками, глюкортикостероидами, амфотерицином возможно увеличение потери калия.Антациды и антибиотики, активные в отношении лактобацилл и бифидобактерий (в т.ч. неомицин, клиндамицин, рифаксимин) снижают эффекты лактулозы.

Особые указания

Препарат Лактулоза не следует принимать при воспалительных заболеваниях ЖКТ в стадии обострения, а также при нарушениях водно-электролитного обмена.У пациентов с сахарным диабетом или другими нарушениями углеводного обмена следует учитывать количество усвояемых углеводов. В 100 мл раствора содержится 17 г усвояемых углеводов, в частности глюкозы, лактозы и галактозы, что соответствует 1,4 хлебных единиц (ХЕ). При лечении запора суточная доза 5 мл/сут соответствует 0,07 ХЕ, суточная доза 45 мл/сут - 0,64 ХЕ. При лечении печеночной энцефалопатии суточная доза 22,5 мл/сут соответствует 0,32 ХЕ, суточная доза 180 мл/сут - 2,56 ХЕ. Слабительный эффект может наступить через 2-10 ч, но при недостаточной дозировке - через 24-48 ч.Во время терапии слабительными средствами рекомендуется принимать достаточное количество жидкости (1,5-2 литра, что соответствует 6-8 стаканам объемом 250 мл).

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.