Инструкция по применению
Лактусан Сироп 300 г

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Фелицата Холдинг
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

Сироп "Лактусан" - препарат, способствующий снижению кислотности кишечника, стимулирующий рост ацидофильных бактерий (в том числе лактобактерий), подавляющий размножение протеолитических бактерий, уменьшающий образование токсических азотсодержащих веществ, играющий важную роль в патогенезе печеночной энцефалопатии. Основой Лактусана является лактулоза - дисахарид, который избирательно стимулирует рост бифидо- и лактобактерий толстого кишечника человека, не всасываясь в кровоток и не оказывая системного действия. Лактусан полностью безопасен как для взрослых, так и для детей. Клинический эффект наступает через 2-3 дня с начала приема.

Состав

Лактулоза.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Лактусан показан при: - коррекции последствий антибиотикотерапии, - дисбактериозах кишечника у взрослых и детей различной степени тяжести, - заболеваниях печени различной этиологии, - хронических запорах у лиц пожилого возраста, детей, у беременных женщин, также у больных, -длительно соблюдающих постельный режим, - колитах и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, - сальмонеллезе и для защиты от кишечной инфекции, - почечной недостаточности, - токсикозе беременных с функциональными расстройствами пищеварения, - аллергических реакциях, - для активизации иммунной системы кишечника.

Способ применения и дозы

Взрослым - 2 чайные ложки 2 раза в день (10 мл 2 раза в день), детям - по 1 чайной ложке 2 раза в день (5 мл 2 раза в день) во время еды, в течение 7-14 дней. Клинический эффект наступает через 2-3 дня с начала приема Лактусана. Продолжительность приема составляет 7-14 дней. При запущенных дисбактериозах продолжительность приема Лактусана увеличивается в 1,5-2 раза. Общее оздоравливающее действие на стареющий организм: суточная доза Лактусана должна быть не ниже 20 мл.

Противопоказания

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов препарата, галактоземии, лактазной недостаточности. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение при беременности и кормлении грудью.

Побочные действия

В первые дни приема Лактусана возможно появление метеоризма, который проходит в течение 3-х дней. Иногда наблюдается слабительный эффект.

Передозировка

При передозировке возможна тошнота, боли в области живота и диарея, что требует коррекции дозы препарата. В случае применения повышенных доз в течение длительного времени при лечении печеночной энцефалопатии у пациента вследствие диареи может развиться электролитный дисбаланс.

Условия хранения

В сухом месте