Инструкция по применению
Латикорт Мазь 0,1 % 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Польша
Производитель: Валеант
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гидрокортизон
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,1%
Срок годности: 36



Действующее вещество

Гидрокортизон

Состав

Гидрокортизона бутират 1 мг.Вспомогательные вещества: вазелин белый - до 1 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

ВсасываниеПосле аппликации происходит накопление активного вещества в эпидермисе, в основном в зернистом слое.МетаболизмГидрокортизона бутират, абсорбированный через кожу, метаболизируется до гидрокортизона и других метаболитов непосредственно в эпидермисе и в последующем, в печени. ВыведениеМетаболиты и незначительная часть неизмененного гидрокортизона бутирата выделяется почками и с желчью.

Показания

Неинфицированные, чувствительные к местным ГКС заболевания кожи, протекающие с чрезмерным ороговением:— себорейный дерматит;— атопический дерматит;— эритродермия;— контактная экзема;— псориаз;— красный плоский лишай.Укусы насекомых.

Способ применения и дозы

Применяют наружно.У взрослых небольшое количество препарата наносят на пораженную кожу 1-3 раза/сут. Курс лечения - 1-3 недели. Доза препарата, используемая в течение недели, не должна превышать 30-60 г. Для улучшения проникновения препарат наносят массирующими движениями. В случаях резистентного течения заболеваний, например, при локализации плотных псориатических бляшек на локтях, коленях, препарат необходимо применять под окклюзионными повязками.У детей препарат применяют с 6-месячного возраста.В детском возрасте подавление функции коры надпочечников может развиваться быстрее. Кроме того, может наблюдаться снижение экскреции гормона роста. При применении препарата в течение длительного времени необходимо наблюдать за массой тела, ростом, уровнем кортизола плазмы. В контрольных исследованиях у детей, которые еженедельно получали по 30-60 г мази Латикорт;, не было выявлено нарушений функции коры надпочечников.При использовании препарата на лице или под окклюзионными повязками (памперсы, пеленки) возможно большая степень всасывания, поэтому рекомендуется наносить минимальную дозу препарата. Лечение должно проводиться непродолжительно и под контролем врача.

Противопоказания

— бактериальные, вирусные и грибковые инфекции кожи;— acne vulgaris, розовые угри;— периоральный дерматит;— нарушение целостности кожных покровов (раны, язвы);— опухоли кожи;— туберкулезные или сифилитические поражения кожи;— поствакциональный период;— детский возраст до 6 мес, при зуде в области ануса - до 12 лет;— повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью следует назначать препарат при сахарном диабете, туберкулезе (системное поражение).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Латикорт; у беременных допускается в случаях, когда по оценке лечащего врача потенциальная польза для беременной преобладает над возможным риском для плода. В этих случаях применение должно быть непродолжительным и ограничиваться небольшими участками кожи. Не рекомендуется применять в I триместре беременности.В период грудного вскармливания следует применять кратковременно на небольшой поверхности кожи и не применять на коже молочной железы.

Побочные действия

Побочные действия развиваются редко и носят обратимый характер.Местные реакции: редко - раздражение кожи.При длительном применении и/или нанесении на большие поверхности, при использовании окклюзионных повязок в редких случаях возможны акнеподобные изменения, гипопигментация, потница, фолликулит, стрии, атрофия кожи, гипертрихоз и вторичные инфекции кожи.В редких случаях возможно развитие аллергического контактного дерматита.

Передозировка

Данных о передозировке препарата Латикорт; нет. При длительном применении препарата в больших дозах возможно появление симптомов гиперкортицизма. Лечение: проводят симптоматическую терапию на фоне постепенной отмены препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Данных о лекарственном взаимодействии препарата Латикорт; с другими средствами не имеется.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата Латикорт; в глаза.В случае развития вторичной бактериальной или грибковой инфекции необходимо назначить наружное антибактериальное или противогрибковое средство.С особой осторожностью следует применять препарат на коже лица в связи с возможностью появления побочных эффектов (телеангиэктазии, атрофия, периоральный дерматит).Если после 7 дней применения не наступает улучшения или наблюдается ухудшение состояния, а также в случае возобновления симптомов через несколько дней после отмены, применение препарата следует прекратить и проконсультироваться с врачом.Хотя применение препарата в высоких дозах в течение длительного времени, особенно при использовании окклюзионных повязок, может привести к увеличению содержания кортизола в плазме крови, это никогда не сопровождается снижением реактивности гипофизарно-надпочечниковой системы, а отмена препарата приводит к быстрой нормализации продукции кортизола.С осторожностью использовать препарат в случаях уже существующих атрофических состояний кожи, особенно у пожилых людей.Риск возникновения побочных эффектов при применении препарата Латикорт; ниже, чем при применении галогенизированных ГКС.Латикорт; мазь рекомендуется применять при подострых воспалительных состояниях и лихенификации.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПрименение препарата не ограничивает психофизических способностей пациента, способности управления автотранспортом и обслуживания машинного оборудования в движении.

Условия хранения

Беречь от детей