Инструкция по применению
Лавасепт концентрат для приготовления раствора для местного и наружного применения 20% 5 мл 1 шт

Характеристики



Форма выпуска: Концентрат
Страна: Германия
Производитель: Фрезениус Каби Дойчланд
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Полигексанид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.2 мг/мл
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Полигексанид

Состав

100 мл препарата содержат: Действующее вещество: Полигексанид 20,00 г (Полигексанид 20 % раствор) 97,98-103,19 г Вспомогательные вещества: Макрогол-4000 1,00 г Хлористоводородная кислота 1 М раствор 0-1 мл Вода для инъекций до 100 мл pH 5,0-7,0

Форма выпуска

Концентрат

Фармакокинетика

При местном и наружном применении практически не всасывается

Показания

Лечение инфицированных ран и поверхностных повреждений мягких тканей Промывание полостей глубоких ран мягких и твердых тканей, в том числе с использованием дренажа, внутрисуставных полостей. Лечение ожогов и отморожений Орошение операционного поля при угрозе инфицирования, при реконструктивных операциях, в т.ч. при трансплантации костных тканей, при эндопротезировании суставов. Промывание имплантатов.

Способ применения и дозы

Наружно и местно. Лавасепт можно использовать только разведенным в концентрации 0,1% или 0,2%. Приготовление 0,1% раствора Лавасепта (0,02% раствора полигексанида) К 1000 мл раствора Рингера без лактата или 0,9% раствора натрия хлорида шприцом добавляют 1,0 мл концентрата. Приготовление 0,2% раствора Лавасепта (0,04% раствора полигексанида) К 1000 мл раствора Рингера без лактата или 0,9% раствора натрия хлорида шприцом добавляют 2,0 мл концентрата. 2 метода приготовления раствора из концентрата: - необходимое количество концентрата стерильным шприцом вводят в емкость со стерильным растворителем и перемешивают; - необходимое количество концентрата смешивают с растворителем, разливают в подходящие емкости и стерилизуют (при температуре 121 °С в течение 15 мин). Разведенный Лавасепт применяют для промывания ран, в том числе с использованием дренажа, а также в виде марлевых салфеток, обильно смоченных раствором. В начале обработки поверхностных гнойных ран, инфицированнных грамотрицательной микрофлорой обычно применяют 0,2% раствор Лавасепта. Для последующей обработки ран, их активного промывания используют 0,1% раствор препарата Продолжительность применения Ограничений по продолжительности использования препарата не выявлено

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Операции на головном мозге, глазах, среднем и внутреннем ухе. Промывание неинфицированных суставов и хрящей. Промывание брюшной и плевральной полостей. Беременность, период грудного вскармливания Детский возраст (до 18 лет) С осторожностью: При операциях на неповрежденных хрящевых тканях.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь), анафилактический шок.

Передозировка

Длительное использование Лавасепта в очень больших количествах может вызвать системное всасывание полигексанида, что может вызвать генерализованную экзантему и лихорадку. Симптомы исчезают после выведения препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственные взаимодействия с другими препаратами не известны. Одновременное использование Лавасепта и других анионных средств может нарушить противомикробную активность препарата.

Особые указания

Лавасепт применяют только в разведенном виде! Препарат предназначен только для наружного и местного применения! Лавасепт, как и другие антисептики, в эксперименте на животных, тормозил рост хрящевой ткани эмбрионов. При продолжительном применении препарат также может привести к повреждению интактного хряща. При попадании препарата на поврежденный хрящ, рану следует промыть раствором Рингера без лактата или 0,9% раствором натрия хлорида. При случайном попадании концентрата в глаза или на кожу их необходимо промыть большим количеством воды В случае аллергической реакции применение препарата следует немедленно прекратить и назначить симптоматическое лечение (блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов). Хранение при температуре ниже 8 °С может вызвать образование кристаллов, которые растворяются при нагревании раствора до 60 °С. Флакон с концентратом после вскрытия хранить не более 6 недель, но не позднее истечения срока годности. Раствор Лавасепта, готовый для применения, хранить 24 часа при температуре не выше 25 °С. Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами: Не выявлено

Условия хранения

Не допускать замерзания