Инструкция по применению
Лазолван Таблетки 30 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Греция
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амброксол
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 30 мг
Срок годности: 60



Действующее вещество

Амброксол

Состав

Действующее вещество: Амброксол (ambroxol). Концентрация действующего вещества (мг): 30

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Гомеопатический препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Показания

Острый и хронический бронхит. пневмония. ХОБЛ. бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты. бронхоэктатическая болезнь.

Способ применения и дозы

Таблетки принимают, запивая жидкостью. Принимать таблетки можно независимо от приема пищи.

Противопоказания

1 триместр беременности. период лактации. детский и подростковый возраст до 18 лет. дефицит лактозы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. повышенная чувствительность к амброксолу или другим компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Амброксол проникает через плацентарный барьер. Доклинические исследования не выявили прямого или косвенного неблагоприятного влияния на беременность, эмбриональное/фетальное, постнатальное развитие и на родовую деятельность. Клинический опыт применения амброксола после 28 недели беременности не обнаружили свидетельств отрицательного влияния препарата на плод. Тем не менее, необходимо соблюдать обычные меры предосторожности при использовании препарата при беременности. Особенно не рекомендуется принимать Лазолван в I триместре беременности. Во II и III триместрах беременности применение препарата возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода. Амброксол может экскретироваться с грудным молоком. Несмотря на то, что нежелательные эффекты у детей, находящихся на грудном вскармливании, не наблюдались, в период лактации не рекомендуется использовать Лазолван сироп. Доклинические исследования амброксола не выявили отрицательного воздействия на фертильность.

Побочные действия

Тошнота. диспепсия, рвота, диарея, абдоминальная боль, сыпь, крапивница. ангионевротический отек, анафилактические реакции (включая анафилактический шок), зуд, гиперчувствительность.

Передозировка

Специфические симптомы передозировки у человека не описаны. Имеются сообщения о случайной передозировке и/или медицинской ошибке, в результате которых наблюдались симптомы известных побочных эффектов препарата Лазолван: тошнота, диспепсия, диарея, рвота, абдоминальная боль. Лечение: искусственная рвота, промывание желудка в первые 1-2 ч после приема препарата, проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

О клинически значимом нежелательном взаимодействии с другими лекарственными препаратами не сообщалось. Амброксол повышает проникновение в бронхиальный секрет амоксициллина, цефуроксима, эритромицина.

Особые указания

Поскольку препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата. Прием препарата необходимо немедленно прекратить при появлении признаков повреждения печени (желтушность, темная моча, боль в правом подреберье, тошнота, отсутствие аппетита, слабость). В случае отсутствия улучшения состояния в течение 1 месяца на фоне приема препарата, пациенту следует обратиться к врачу. Влияние на способность управлять механизмами и автомобилем: в период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций. В состав препарата входит этиловый спирт (этанол) 43% по массе. Ременс (Remens) – капли содержат в разовой дозе (10 капель) 0,17 г алкоголя. В максимальной суточной дозе (8 раз в день по 10 капель) содержится 1,35 г этилового спирта (этанола).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении