Инструкция по применению
Ледибон таблетки 2,5 мг 28 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Чехия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тиболон
Количество в упаковке: 28
Дозировка действующего вещества: 2,5 мг
Срок годности: 24



Действующее вещество

Тиболон

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: тиболон - 2.5 мг.Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (микронизированный) - 12.5 мг, лактозы моногидрат (лактоза прямого прессования) - 74.5 мг, крахмал картофельный - 9.5 мг, аскорбил пальмитат - 500 мкг, магния стеарат - 500 мкг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание и метаболизмАбсорбция высокая.Метаболизируется в печени с образованием гидрофильных продуктов, часть из которых фармакологически активна. ВыведениеВыводится почками (в т.ч. метаболиты) и через кишечник.

Показания

лечение симптомов эстрогенной недостаточности у женщин в постменопаузе; профилактика остеопороза у женщин в постменопаузе, имеющих высокий риск возникновения переломов и при непереносимости других групп препаратов, применяемых для профилактики остеопороза.

Способ применения и дозы

Препарат Ледибон следует принимать по истечении 12 месяцев после последней естественной менструации. Если препарат Ледибон начать принимать раньше указанного срока, то увеличивается вероятность нерегулярных кровянистых выделений/кровотечений из влагалища. Перед началом приема препарата Ледибон следует исключить злокачественные новообразования органов репродуктивной системы, независимо от того, принимает женщина другой препарат ЗГТ или нет, особенно в случае появления кровянистых выделений из половых путей.Доза препарата - одна таблетка в сутки.Коррекции дозы с учетом возраста не требуется. Таблетки необходимо проглатывать, запивая водой, предпочтительно в одно и то же суток.Блистеры с препаратом Ледибон маркированы днями недели. Начните прием препарата с приема таблетки, отмеченной текущим днем. Например, если день приема совпадает с понедельником, то необходимо принять таблетку, отмеченную понедельником, из верхнего ряда блистера. Далее принимайте таблетки, согласно дням недели. Из следующего блистера таблетки принимаются без пропусков и перерывов. Не допускайте пропуска в приеме препарата при смене блистера или упаковки.При лечении препаратом Ледибон нет необходимости добавлять гестагенсодержащие препараты.Если пропущен прием очередной таблетки, дальнейшая тактика зависит от времени опоздания от запланированного времени приема. Если с момента пропуска таблетки прошло меньше 12 часов, необходимо принять пропущенную таблетку, как можно скорее. Если опоздание в приеме таблеток составило более 12 часов, следует пропустить прием, и принять следующую таблетку в обычное время.Не рекомендуется принимать две таблетки одновременно для восполнения пропущенной дозыПереход с циклического или непрерывного режима приема препарата для заместительной гормональной терапии (ЗГТ) на тиболонПри переходе с циклического режима приема препарата для ЗГТ лечение препаратом Ледибон необходимо начинать на следующий день после завершения предыдущей схемы лечения. В случае перехода с непрерывного режима приема комбинированного препарата для ЗГТ лечение можно начинать в любое время.

Противопоказания

Беременность и период грудного вскармливания.Период менее года после последней менструации.Диагностированный (в том числе в анамнезе) рак молочной железы или подозрение на него.Диагностированные (в том числе в анамнезе) злокачественные эстрогенозависимые опухоли (например, рак эндометрия) или подозрение на них.Кровотечение из влагалища неясной этиологии.Нелеченная гиперплазия эндометрия.Тромбозы (венозные или артериальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе тромбоз и тромбофлебит глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, ишемические или геморрагические цереброваскулярные нарушения).Диагностированные тромбофилические состояния (например, дефицит протеина С, протеина S или антитромбина III) (см. раздел Особые указания).Состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, транзиторные ишемические атаки, стенокардия), в настоящее время или в анамнезе.Выраженные или многочисленные факторы риска развития венозного или артериального тромбоза (в том числе фибрилляция предсердий, осложненные поражения клапанного аппарата сердца и подострый бактериальный эндокардит; неконтролируемая артериальная гипертензия; расширенное оперативное вмешательство, сопровождающееся длительной иммобилизацией; обширная травма; ожирение (индекс массы тела > 30 кг/м), курение в возрасте старше 35 лет).Сердечно-сосудистая недостаточность в стадии декомпенсации.Острое заболевание печени или заболевание печени в анамнезе, после которого показатели функции печени не вернулись к норме.Печеночная недостаточность.Злокачественные или доброкачественные опухоли печени (в том числе, аденома печени) в настоящее время или в анамнезе.Порфирия.Отосклероз, возникший во время предыдущей беременности или при применении гормональных контрацептивных препаратов в анамнезе.Установленная гиперчувствительность к активному веществу или к любому вспомогательному веществу препарата.Редкие наследственные заболевания: непереносимость галактозы, недостаточность лактазы Лаппа или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Условия хранения

В сухом месте