Инструкция по применению
Легалон Капсулы 140 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: Меда Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Расторопши пятнистой плодов экстракт
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 140 мг

Описание

Торговое наименование: Легалон® 140 Международное непатентованное или группировочное наименование: Расторопши пятнистой плодов экстракт Лекарственная форма: капсулы. Описание: Внешний вид капсулы: твердые желатиновые капсулы, размер «1», корпус и крышечка коричневого цвета. Внешний вид содержимого капсулы: порошок желтого цвета. Фармакотерапевтическая группа: гепатопротекторное средство. Код АТХ: A05BA03.

Действующее вещество

Расторопши пятнистой плодов экстракт

Состав

Одна капсула содержит: Активное вещество: расторопши пятнистой плодов экстракт сухой (36-44:1) – 173,0-186,7 мг, эквивалентно 140 мг силимарина (ДНФГ), эквивалентно 108,2 мг силимарина (ВЭЖХ/Герм.Ф.) в расчете на силибинин. Вспомогательные вещества: полисорбат 80, повидон, маннитол, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), магния стеарат. Оболочка твердая желатиновая капсула, размер «1», в состав которой входит: желатин, краситель железа оксид красный (Е172), титана диоксид (Е171), натрия лаурилсульфат, краситель железа оксид черный (Е172).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний печени, цирроза печени и токсических поражений печени (вызванных токсичными для печени веществами).

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды, запивая достаточным количеством жидкости. По 1 капсуле 3 раза в день. Поддерживающая доза - по 1 капсуле 2 раза в день. Длительность терапии определяет врач.

Противопоказания

Частота развития побочных эффектов определена следующим образом: Очень часто: > 1/10, Часто: <1/10 > 1/100, Нечасто: <1/100 > 1/1000, Редко: <1 /1000> 1/10000, Очень редко: <1/10000. Нарушения со стороны иммунной системы:Очень редко - реакции гиперчувствительности, сыпь. Нарушения со стороны дыхательных путей:Очень редко - одышка. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:Редко - желудочно-кишечные расстройства, мягкий стул.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции, редко - послабляющее действие.

Особые указания

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ Особые требования отсутствуют. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В ходе исследований прямого или косвенного токсического действия на репродуктивную функцию не выявлено. В качестве предупреждающей меры желательно избегать применения препарата во время беременности и в период грудного вскармливания. ПЕРЕДОЗИРОВКА О случаях передозировки не сообщалось. Возможно усиление побочного действия препарата. Лечение: при передозировке следует провести симптоматическую терапию. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ Не изучалось. ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

СРОК ГОДНОСТИ 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 оС. Хранить в недоступном для детей месте