Инструкция по применению
Легалон Капсулы 70 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: Меда Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Расторопши пятнистой плодов экстракт
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 70 мг



Описание

Торговое название: Легалон® 70 Международное непатентованное или группировочное название: Расторопши пятнистой плодов экстракт& Лекарственная форма: капсулы. Описание: Внешний вид капсулы: твердые желатиновые капсулы, размер «2», корпус и крышечка коричневого цвета. Внешний вид содержимого капсулы: порошок желтого цвета. Фармакотерапевтическая группа: гепатопротекторное средство. Код АТХ: A05BA03.

Действующее вещество

Расторопши пятнистой плодов экстракт

Состав

Одна капсула содержит: Активное вещество: расторопши пятнистой плодов экстракт сухой (36-44:1) - 86,5-93,35 мг, эквивалентно 70 мг силимарина (ДНФГ), эквивалентно 54,1 мг силимарина (ВЭЖХ/Герм.Ф.) в расчете на силибинин. Вспомогательные вещества: полисорбат 80, повидон, маннитол, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), магния стеарат. Оболочка: твердая желатиновая капсула, размер «2», в состав которой входит: желатин, краситель железа оксид красный (Е172), титана диоксид (Е171), натрия лаурилсульфат, краситель железа оксид черный (Е172).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Токсические поражения печени (алкоголизм, интоксикация галогенсодержащими углеводородами, соединениями тяжелых металлов, лекарственные поражения печени) и их профилактика.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды, запивая небольшим количеством воды. По 2 капсулы 3 раза в день. Поддерживающая доза – по 1 капсуле 3 раза в день.

Противопоказания

Аллергические реакции, редко – послабляющее действие

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции, редко - послабляющее действие.

Особые указания

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ Не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного вскармливания. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ Не описано.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 оС. Хранить в недоступном для детей месте. СРОК ГОДНОСТИ 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.