Инструкция по применению
Леккер Йод Раствор спиртосодержащий 5 % 5 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Амма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Йод
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Йод

Состав

Раствор йода спиртовой 5% – лекарственный препарат в форме раствора, в 100 мл содержится в качестве действующего вещества йода кристаллического – 5 г, в качестве вспомогательных веществ калий йодистый, спирт этиловый (этанол) и вода очищенная 1:1.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Назначают в качестве антисептического, кровоостанавливающего средства; для обработки операционного поля, операционных швов, мест для парентерального введения лекарственных веществ (инъекций) и пальцев рук хирурга; при первичной обработке свежих ран, для лечения инфицированных ран, при травмах, ссадинах, порезах, фурункулезе, абсцессах и свищах; как отвлекающее и раздражающее средство при хронических воспалениях суставов, сухожилий, мышц.

Способ применения и дозы

Раствор йода спиртовой 5% применяют наружно. Обработку поверхности кожи проводят однократно. Смазывают пораженные участки кожи по краям раны марлевыми или ватными тампонами, смоченными в растворе йода спиртового 5%, не нанося на рану. При обработке операционного поля кожу дважды протирают стерильным марлевым тампоном, смоченным в растворе йода. Для отвлекающего действия раствор йода спиртового 5% наносится на кожу в виде сетки. При применении раствора йода спиртового 5% согласно инструкции симптомы передозировки у животных не выявляются. Повторную обработку в течение суток желательно не проводить, так как избыток активного йода может вызвать химический ожог. Особенностей действия раствора йода спиртового 5% при первом применении и отмене не установлено. Частое применение раствора йода 5% не предусмотрено. Увеличение интервалов между обработками на эффективность лечения не влияет.

Противопоказания

Противопоказанием для применения раствора йода спиртового 5% является индивидуальная повышенная гиперчувствительность к йодсодержащим лекарственным препаратам.

Побочные действия

При правильном использовании побочные явления, как правило, не наблюдаются. При повторных и частых смазываниях раствором йода в течение суток, а также при длительном использовании на обширных поверхностях возможны воспалительные реакции и ожоги кожи, а также явления йодизма, то есть отравление йодом (крапивница, ринит, слюнотечение, слезотечение, отек век).

Особые указания

Раствор йода спиртовой 5% фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака. При совместном применении с желтой ртутной мазью возможно образование ртути йодида обладающего прижигающим действием. Продукцию животного происхождения, полученную от животных после обработки раствором йода спиртового 5%, используют без ограничений.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении