Инструкция по применению
Леспефлан Раствор для приема внутрь флакон 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Дальхимфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Леспедезы двухцветной побеги
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 70.8 г/100 мл

Действующее вещество

Леспедезы двухцветной побеги

Состав

В 100 мл раствора содержится: побеги леспедезы двухцветной 70.8 г; этанол (спирт этиловый) 95%; вода очищенная; аниса масло

Форма выпуска

Раствор

Показания

Хроническая почечная недостаточность различного происхождения, в латентной компенсированной и интермиттирующей стадиях (в составе комбинированной терапии).

Способ применения и дозы

Ударная доза - 5-15 мл/сут; средняя суточная доза - 5-10 мл; поддерживающая суточная доза при долгосрочном лечении - 2.5-5 мл в течение 15 дней каждого месяца. Предварительно разведя в небольшом количестве воды.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов Леспефлана. Беременность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказана при беременности, в период лактации.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции, гипонатриемия

Взаимодействие с другими препаратами

В связи с наличием алкоголя нельзя назначать препарат больным, получающим лечение препаратами, угнетающими центральную нервную систему, инсулином, гипогликемическими средствами (метформин, производные сульфонилмочевины); лекарственными средствами, вызывающими непереносимость алкоголя (дисульфирамоподобное действие).

Особые указания

При развитии гипонатриемии ее следует компенсировать введением препаратов натрия. При применении в виде настойки следует иметь в виду, что средняя суточная доза содержит от 2.9 до 11.6 г этанола. Нельзя назначать совместно с лекарственными средствами, угнетающими ЦНС, инсулином, пероральными гипогликемическими средствами (метформин, производные сульфонилмочевины), с препаратми, обладающими дисульфирамоподобным действием.При применении в виде настойки: вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций, что следует учитывать при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.