Инструкция по применению
Левитра таблетки покрытые оболочкой 10мг N4

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Байер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Варденафил
Количество в упаковке: 4
Дозировка действующего вещества: 10 мг



Описание

Диспергирующие таблетки Левитра - средство лечения эректильной дисфункции. Применяется для лечения эректильной дисфункции, восстанавливает в условиях сексуальной стимуляции нарушенную эректильную функцию путем увеличения кровотока в половом члене.

Действующее вещество

Варденафил

Состав

Варденафил, аспартам, ароматизатор, стеарат магния, кросповидон, маннитол, коллоидный диоксид кремния, сорбитол.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Лечение эректильной дисфункции, характеризующейся неспособностью к достижению или сохранению эрекции полового члена, достаточной для удовлетворительного полового акта. Эффективен только при сексуальной стимуляции.

Способ применения и дозы

Таблетку принимают сразу же после ее извлечения из упаковки. Таблетку следует держать на языке до ее полного растворения и затем проглотить, не запивая жидкостью. В начале лечения рекомендуемая доза составляет 10 мг (приблизительно за 25-60 мин до сексуального контакта). Максимальная рекомендованная доза составляет 10 мг 1 раз в сутки.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, тяжелые нарушения функции печени, заболевания почек в терминальной стадии, требующие гемодиализа, артериальная гипотензия (систолическое АД в покое менее 90 мм рт. ст.), недавно перенесенный инсульт или инфаркт миокарда (в течение последних 6 месяцев), нестабильная стенокардия, наследственные дегенеративные заболевания сетчатки, например, пигментный ретинит, детский возраст (до 18 лет).

Побочные действия

Инфекционные и паразитарные заболевания: редко - конъюнктивит. Нарушения со стороны иммунной системы: нечасто - аллергический отек и ангионевротический отек, редко - аллергическая реакция. Нарушения со стороны нервной системы: очень часто - головная боль, часто - головокружение, нечасто - нарушение чувствительности, сонливость, нарушения сна, редко - обморок, амнезия, судороги. Нарушения со стороны органа зрения: нечасто - нарушения зрения, гиперемия конъюнктивы глазного яблока, нарушения цветовосприятия, боль в глазных яблоках и дискомфорт в глазах, фотофобия, редко - повышение внутриглазного давления. Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения: нечасто - звон в ушах, вертиго. Нарушения со стороны сердца: нечасто - сердцебиение, тахикардия, редко - стенокардия, инфаркт миокарда, желудочковые тахиаритмии. Нарушения со стороны сосудов: часто - вазодилатация, редко - гипотензия. Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто - заложенность носа, нечасто- одышка, заложенность околоносовых пазух. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: часто - диспепсия, нечасто - тошнота, боли в животе, сухость во рту, диарея, гастроэзофагеальная, рефлюксная болезнь, гастрит, рвота. Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: нечасто - повышение уровня трансаминаз. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто - эритема, сыпь. Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: нечасто - боль в спине, повышение уровня креатинфосфокиназы (КФК), повышенный мышечный тонус и судороги, миалгия. Нарушения со стороны половых органов и молочной железы: нечасто - усиление эрекции, редко - приапизм. Общие расстройства и нарушения в месте введения: нечасто - плохое самочувствие, редко - боль в груди.

Передозировка

Оценка побочных эффектов проводилась при назначении варденафила в дозе до 120 мг в сутки. При назначении варденафила в дозе до 80 мг 1 раз в сутки и в дозе до 40 мг несколько раз в сутки в течение 4 недель не наблюдалось развития серьезных побочных реакций. При применении доз варденафила от 80 до 120 мг увеличивается риск развития побочных эффектов. При применении варденафила в дозе 40 мг 2 раза в сутки, отмечались выраженные боли в пояснице без признаков токсического действия на мышечную и нервную системы. В случаях передозировки следует проводить стандартную поддерживающую терапию. Поскольку варденафил в высокой степени связывается с белками плазмы, и лишь незначительное количество препарата выводится почками, эффективность гемодиализа маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат противопоказан при одновременном применении с умеренно активными или мощными ингибиторами CYP3A4, такими как кетоконазол, итраконазол, ритонавир, индинавир, эритромицин и кларитромицин.

Особые указания

До назначения препаратов, применяемых для лечения эректильной дисфункции, врач должен оценить состояние сердечно-сосудистой системы, поскольку существует риск развития осложнений со стороны сердца во время сексуальной активности.