Инструкция по применению
Леволет Р Таблетки 500 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Др.Реддис
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Левофлоксацин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 24

Действующее вещество

Левофлоксацин

Состав

В 1 таблетке содержится: левофлоксацина гемигидрат 512.466 мг, что соответствует содержанию левофлоксацина 500 мг. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (Avicel PH 101), крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, кросповидон, гипромеллоза (15 cps), целлюлоза микрокристаллическая (Avicel PH 102), магния стеарат. Состав пленочной оболочки: краситель опадрай белый OY 58900 (гипромеллоза 5 cP, титана диоксид, макрогол 400).

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь абсорбируется из ЖКТ быстро и практически полностью. Прием пищи мало влияет на скорость и полноту абсорбции. Биодоступность составляет 99%. Cmax достигается через 1-2 ч и при приеме 250 мг и 500 мг составляет 2.8 и 5.2 мкг /мл соответственно. Связывание с белками плазмы - 30-40%. Хорошо проникает в органы и ткани: легкие, слизистую оболочку бронхов, мокроту, органы мочеполовой системы, полиморфноядерные лейкоциты, альвеолярные макрофаги. В печени небольшая часть окисляется и/или дезацетилируется. Почечный клиренс составляет 70% общего клиренса. T1/2 - 6-8 ч. Выводится из организма преимущественно почками путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Менее 5% левофлоксацина экскретируется в виде метаболитов. В неизмененном виде с мочой в течение 24 ч выводится 70% и за 48 ч - 87%; в кале за 72 ч обнаруживается 4% принятой внутрь дозы. После в/в инфузии 500 мг в течение 60 мин Cmax - 6.2 мкг/мл. При в/в однократном и многократном введении кажущийся Vd после введения той же дозы составляет 89-112 л, Cmax - 6.2 мкг/мл, T1/2 - 6.4 ч.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания легкой и средней степени тяжести, вызванные чувствительными к препарату возбудителями:Внебольничная пневмония. Лекарственно-устойчивые формы туберкулеза (в составе комплексной терапии). Осложненные инфекции почек и мочевыводящих путей, включая пиелонефрит. Неосложненные инфекции мочевыводящих путей.Простатит, в т.ч. Бактериальный. Септицемия/бактериемия, связанная с указанными выше Показания к применениюми. Интраабдоминальная инфекция.Инфекции лор-органов (острый синусит).Инфекции нижних дыхательных путей (обострение хронического бронхита).Инфекции кожи и мягких тканей.

Способ применения и дозы

Внутрь, до еды или в перерыве между приемами пищи, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Синусит: по 500 мг 1 раз в сутки. Курс лечения - 10–14 дней. Обострение хронического бронхита: по 250–500 мг 1 раз в сутки. Курс лечения - 10–14 дней. Инфекции кожи и мягких тканей: по 250 мг 1–2 раза в сутки или по 500 мг 1 раз в сутки. Курс лечения - 7–14 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к левофлоксацину или другим хинолонам. Повышенная чувствительность к вспомогательным компонентам леволета.Эпилепсия. Поражения сухожилий, связанные с приемом хинолонов в анамнезе. Детский и подростковый возраст до 18 лет. Беременность. Период лактации (грудного вскармливания). С осторожностью: Пожилой возраст (высокая вероятность наличия сопутствующего снижения функции почек). Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Левофлоксацин противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Частота развития побочных эффектов классифицируется в зависимости от частоты встречаемости часто (1–10%), иногда (менее 0,1–1%), редко (0,01–0,1%), очень редко (менее 0,01%), включая отдельные сообщения.Со стороны системы крови и органов кроветворения иногда - эозинофилия, лейкопения. редко - нейтропения, тромбоцитопения. очень редко - выраженный агранулоцитоз. в отдельных случаях - гемолитическая анемия, панцитопения.Со стороны пищеварительной системы часто - тошнота, диарея, повышение активности АЛТ, АСТ, дисбактериоз. иногда - потеря аппетита, рвота, боли в животе, нарушения пищеварения, гипербилирубинемия. редко - диарея с примесью крови (в очень редких случаях это может являться признаком воспаления кишечника или псевдомембранозного колита). очень редко - гепатит.Со стороны сердечно-сосудистой системы редко - тахикардия, снижение АД. очень редко - сосудистый коллапс. в отдельных случаях - удлинение интервала QT.Со стороны центральной и периферической нервной системы иногда - головная боль, головокружение, скованность движений, сонливость, нарушение сна. редко - парестезии в кистях, дрожь, беспокойство, состояния страха, приступы судорог, спутанность сознания. очень редко - психотические реакции типа галлюцинаций и депрессий, нарушения движений.Со стороны органов чувств очень редко - нарушения зрения и слуха, обоняния, вкусовой и тактильной чувствительности.Со стороны обмена веществ очень редко - гипогликемия (проявляющаяся резким повышением аппетита, нервозностью, испариной, дрожью). в отдельных случаях - обострение имеющейся порфирии.Со стороны мочевыделительной системы редко - гиперкреатининемия. очень редко - ухудшение функции почек вплоть до острой почечной недостаточности (например вследствие аллергических реакций - интерстициальный нефрит).Со стороны костно-мышечной системы редко - поражения сухожилий (включая тендинит), суставные и мышечные боли. очень редко - разрывы сухожилия (в т.ч. Ахиллова, которые могут носить двусторонний характер и проявляться в течение 48 ч после начала лечения), мышечная слабость (имеет особое значение для больных миастенией). в отдельных случаях - рабдомиолиз. Аллергические реакции иногда - зуд и покраснение кожи. редко - анафилактические и анафилактоидные реакции (проявляющиеся такими симптомами, как крапивница, бронхоспазм и возможное тяжелое удушье, а также в редких случаях - отек лица, гортани). очень редко - резкое снижение АД, анафилактический шок. в отдельных случаях - синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) и экссудативная мультиформная эритема, аллергический пневмонит, васкулит.Дерматологические реакции очень редко - фотосенсибилизация. Прочие иногда - астения. очень редко - стойкая лихорадка, развитие суперинфекции.

Взаимодействие с другими препаратами

Левофлоксацин увеличивает Т1/2 циклоспорина. Эффект левофлоксацина снижают препараты, угнетающие моторику кишечника, сукральфат, магний- и алюминийсодержащие антацидные средства и соли железа (необходим перерыв между приемом не менее 2 ч). При одновременном применении НПВС, теофиллин повышают судорожную готовность, ГКС - повышают риск разрыва сухожилий. Циметидин и лекарственные средства, блокирующие канальцевую секрецию, замедляют выведение левофлоксацина. Раствор левофлоксацина для в/в введения совместим с 0.9% раствором натрия хлорида, 5% раствором декстрозы, 2.5% раствором Рингера с декстрозой, комбинированными растворами для парентерального питания (аминокислоты, углеводы, электролиты). Раствор левофлоксацина для в/в введения нельзя смешивать с гепарином и растворами, имеющими щелочную реакцию.

Особые указания

С осторожностью применяют левофлоксацин пациентам пожилого возраста (высокая вероятность наличия сопутствующего снижения функции почек). После нормализации температуры рекомендуется продолжать лечение не менее 48-78 ч. Длительность в/в вливания 500 мг (100 мл инфузиоиного раствора) должна составлять не менее 60 мин. Во время лечения необходимо избегать солнечного и искусственного УФ облучения во избежание повреждения кожных покровов (фотосенсибилизация). При появлении признаков тендинита левофлоксацин немедленно отменяют. Следует иметь в виду, что у больных с поражением головного мозга в анамнезе (инсульт, тяжелая травма) возможно развитие судорог, при недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы - риск развития гемолиза. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте