Инструкция по применению
Левомеколь Мазь для наружного применения 10 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол
Количество в упаковке: 1



Описание

Мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол

Состав

Состав на 1 г препарата: действующие вещества - диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 40 мг, хлорамфеникол – 7,5 мг; вспомогательные вещества – макрогол-1500 – 190,5 мг, макрогол-400 – 762 мг.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Инфицированные раны (включая порезы и ссадины) различной локализации (в том числе инфицированные смешанной микрофлорой) в первой фазе раневого процесса.

Способ применения и дозы

Местно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этом случае мазь предварительно подогревают до 35-36°С. Перевязки производят ежедневно, один раз в день, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс. При больших раневых поверхностях суточная доза мази в пересчете на хлорамфеникол не должна превышать 3 г. Длительность лечения зависит от тяжести и течения заболевания

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 1 года (у новорожденных биотрансформация хлорамфеникола происходит более медленно, чем у взрослых).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности возможно только в случае, если польза для матери превышает риск для плода. В период лактации следует либо прекратить применение препарата, либо кормление грудью.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожные высыпания).

Передозировка

О случаях передозировки препарата ЛевомекольÒ мазь не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Не оказывает.

Условия хранения

При температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.