Инструкция по применению
Левометил мазь 10 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Зеленая Дубрава
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диоксометилтетрагидропиримидин, хлорамфеникол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 4,0 г + 0,75 г
Срок годности: 3 года 6 месяцев



Описание

Левометил - комбинированный лекарственный препарат для наружного применения в форме мази. Действующие вещества - диоксометилтетрагидропиримидин и хлорамфеникол.Препарат оказывает противомикробное и противовоспалительное действие и стимулирует процессы регенерации в ране.Применяется при гнойных ранах в первой, гнойно-некротической фазе раневого процесса. Препарат представляет собой однородный линимент белого или белого с желтоватым оттенком цвета со слабым характерным запахом. Масса 10 г.

Действующее вещество

Диоксометилтетрагидропиримидин, хлорамфеникол

Состав

Действующие вещества: диоксометилтетрагидропиримидин 4,0 г, хлорамфеникол 0,75 г.Вспомогательные вещества: макрогол 400 76,2 г, макрогол 1500 19,05 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

гнойные раны, в том числе инфицированные смешанной микрофлорой, в первой гнойно-некротической фазе раневого процессаПеред применением при необходимости проконсультируйтесь с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно.Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение препарата в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этом случае мазь предварительно подогревают до 35-36 °С. Перевязки производят ежедневно, один раз в день, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс. При больших раневых поверхностях суточная доза мази в пересчете на хлорамфеникол не должна превышать 3 г.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 1 года (у новорожденных биотрансформация хлорамфеникола происходит более медленно, чем у взрослых)

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, если потенциальная польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожные высыпания). В этом случае применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с наружными лекарственными формами эритромицина, клиндамицина, линкомицина и гентамицина взаимное ослабление действия.

Особые указания

При нанесении на обширные участки кожи и длительных курсах лечения необходимо проводить клинический анализ крови.Препарат не влияет на способность заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и др. транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.