Инструкция по применению
Левометил Мазь для наружного применения 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Зеленая Дубрава
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 750 мг+ 4 г/100 г



Описание

Мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол

Состав

Мазь - 100 г: Действующие вещества: хлорамфеникол (левомицетин) - 0,75 г; диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) - 4,0 г; Вспомогательные вещества: макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) - 76,2 г, макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) - 19,05 г. Мазь для наружного применения в тубах алюминиевых по 30,0 г. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Препарат всасывается незначительно и системного действия не оказывает.

Показания

Гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса.

Способ применения и дозы

Полоса мази диаметром 5 мм и длиной 1 см имеет массу в среднем 0,3 г, что соответствует 10 мг хлорамфеникола и 20 мг диоксометилтетрагидропиримидина. Взрослым и детям препарат наносят один раз в сутки непосредственно на поврежденные участки кожи из расчета 0,3 г на 1 см2 раневой поверхности или наносят на стерильные марлевые салфетки из расчета 0,3-0,6 г на 1 см2 раневой поверхности, накрывают салфеткой поврежденный участок кожи и закрепляют повязкой. Суточная доза мази в пересчете на хлорамфеникол не должна превышать 3 г хлорамфеникола.

Противопоказания

Гиперчувствительность, микозы кожи, дерматит, экзема, псориаз. С осторожностью: беременность, период лактации, дети до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции (крапивница, ангионевротический отек). В этом случае применение препарата прекращают и назначают антигистаминные средства.

Передозировка

Маловероятна в связи низкой абсорбцией. При нанесении мази на обширные поверхности и длительном лечении возможно появление симптомов со стороны кроветворной системы - анемия, лейкопения, тромбоцитопения, ретикулоцитопения, которые обычно проходят после отмены препарата и назначения симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с наружными лекарственными формами эритромицина, клиндамицина, линкомицина и гентамицина взаимное ослабление действия.

Особые указания

При нанесении на обширные участки кожи и длительных курсах лечения, необходимо проводить клинический анализ крови. Препарат не влияет на способность заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и др. транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).