Инструкция по применению
Левомицетин Раствор для наружного применения спиртовой 1 % 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество:
Прокаин+Хлорамфеникол+Этанол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%

Описание

Прозрачная бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость, с запахом спирта.

Действующее вещество

Прокаин+Хлорамфеникол+Этанол

Состав

Активное вещество: хлорамфеникол (левомицетин) - 1 г. Вспомогательное вещество: этанол (этиловый спирт) 70 % - до 100 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Степень системного действия при наружном применении препарата не изучена.

Показания

Бактериальные инфекции кожи вызванные чувствительными микроорганизмами в том числе инфицированные ожоги (поверхностные и ограниченные глубокие) пролежни трофические язвы раны фурункулы.

Способ применения и дозы

Наружно. Поврежденные участки обрабатывают ватным тампоном смоченным в растворе несколько раз в сутки.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость беременность и лактация угнетение костномозгового кроветворения острая интермиттирующая порфирия дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы печеночная почечная недостаточность заболевания кожи (грибковые заболевания псориаз экзема) период новорожденности (до 4 недель).

Применение при беременности и кормлении грудью

При местном применении возможна системная абсорбция. В связи с этим кормящим женщинам следует прекратить либо грудное вскармливание либо применение препарата. Противопоказан к применению при беременности.

Побочные действия

Аллергические реакции: кожная сыпь ангионевротический отек. Со стороны органов кроветворения: редко - тромбоцитопения ретикулоцитопения лейкопения ранулоцитопения эритропения апластическая анемия агранулоцитоз.

Передозировка

Может возникнуть при случайном приеме препарата внутрь. Симптомы: "серый синдром" (кардиоваскулярный синдром) у недоношенных и новорожденных при лечении высокими дозами (причиной развития является накопление хлорамфеникола обусловленное незрелостью ферментов печени и его прямое токсическое действие на миокард) - голубовато-серый цвет кожи пониженная температура тела неритмичное дыхание отсутствие реакций сердечно-сосудистая недостаточность (летальность достигает 40 %). Лечение: гемосорбция симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с эритромицином клиндамицином линкомицином отмечается взаимное ослабление действия за счет того что хлорамфеникол может вытеснять эти препараты из связанного состояния или препятствовать их связыванию с субъединицей 50S бактериальных рибосом. Снижает антибактериальный эффект пенициллинов и цефалоспоринов. Лекарственные средства угнетающие костномозговое кроветворение увеличивают риск миелбсупрессии.

Особые указания

В процессе лечения необходим систематический контроль картины периферической крови. С осторожностью назначают пациентам получившим ранее лечение цитостатическими препаратами или лучевую терапию. При одновременном приеме этанола возможно развитие дисульфирамоподобной реакции (гиперемия кожных покровов тахикардия тошнота рвота рефлекторный кашель судороги). Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Препарат не влияет на скорость нервно-мышечной проводимости в рекомендованных дозах его можно применять лицам управляющим транспортными средствами и другими механизмами.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.