Инструкция по применению
Левомицетин Ивановская ФФ Раствор для наружного применения спиртовой 3 % 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Ивановская Фармацевтическая Фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Хлорамфеникол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 3%

Описание

Прозрачная бесцветная или бесцветная со слегка желтоватым оттенком жидкость с характерным запахом спирта.

Действующее вещество

Хлорамфеникол

Состав

Активное вещество: 1% раствор: Хлорамфеникол 1 г. 3% раствор: Хлорамфеникол 3 г.
Вспомогательное вещество: Этанол (этиловый спирт) 70 % до 100 мл

Форма выпуска

Раствор

Показания

Бактериальные инфекции кожи, вызванные чувствительными микроорганизмами, в т. ч. инфицированные ожоги (поверхностные и ограниченные глубокие), пролежни, трофические язвы, фурункулы.

Способ применения и дозы

Наружно, поврежденные участки обрабатывают ватным тампоном, смоченным в растворе, 2-3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения - по показаниям в зависимости от характера и локализации пораженного участка.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость, угнетение костномозгового кроветворения, острая интермиттирующая порфирия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, печеночная, почечная недостаточность, заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые поражения), беременность, период грудного вскармливания, период новорожденности (до 4 нед.).

Побочные действия

Аллергические реакции: кожная сыпь, ангионевротический отек. Со стороны органов кроветворения: ретикулоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, эритропения, апластическая анемия, агранулоцитоз.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с эритромицином, клиндамицином, линкомицином отмечается взаимное ослабление действия за счет того, что хлорамфеникол может вытеснять эти препараты из связанного состояния или препятствовать их связыванию с субъединицей 50S бактериальных рибосом. Снижает антибактериальный эффект пенициллинов и цефалоспоринов. Лекарственные средства, угнетающие костномозговое кроветворение, увеличивают риск миелосупрессии.

Особые указания

В процессе лечения необходим систематический контроль картины периферической крови. При нанесении на обширные поверхности с одновременным приемом этанола возможно развитие дисульфирамоподобных реакций (гиперемия кожных покровов, тахикардия, тошнота, рвота, рефлекторный кашель, судороги).Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.