Инструкция по применению
Левомицетин 3% Раствор спиртовой 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тверская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Прокаин+Хлорамфеникол+Этанол
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость с характерным запахом спирта.

Действующее вещество

Прокаин+Хлорамфеникол+Этанол

Состав

Действующее вещество: Хлорамфеникол (левомицетин) - 1 г Вспомогательное вещество: Этанол (спирт этиловый) 70% - до 100 мл.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Бактериальные инфекции кожи, вызванные чувствительными микроорганизмами, в т. ч. инфицированные ожоги (поверхностные и ограниченные глубокие), пролежни, трофические язвы, фурункулы.

Способ применения и дозы

Наружно, пораженные участки обрабатывают ватным тампоном, смоченным в растворе, несколько раз в сутки. Продолжительность лечения - по показаниям в зависимости от характера и локализации пораженного участка. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость, угнетение костномозгового кроветворения, острая интермиттирующая порфирия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, печеночная, почечная недостаточность, заболевания кожи (экзема, псориаз, грибковые поражения), период новорожденности (до 4 недель).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применять препарат при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Аллергические реакции: кожная сыпь, ангионевротический отек. Со стороны органов кроветворения: редко - тромбоцитопения, эритропения, апластическая анемия, агранулоцитоз, ретикулоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки препаратом не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с эритромицином, клиндамицином, линкомицином отмечается взаимное ослабление действия за счет того, что хлорамфеникол может вытеснять эти препараты из связанного состояния или препятствовать их связыванию с субстанцией 50S бактериальных рибосом. Снижает антибактериальный эффект пенициллинов и цефалоспоринов. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты, (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

В процессе лечения необходим систематический контроль картины периферической крови. При одновременном приеме этанола возможно развитие дисульфирамоподобных реакций (гиперемия кожных покровов, тахикардия, тошнота, рвота, рефлекторный кашель, судороги). Применять препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Применение препарата не влияет на управление транспортными средствами и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.