Инструкция по применению
Левомикон-ТФФ Мазь 40 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол
Количество в упаковке: 1



Описание

Мазь для наружного применения белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол

Состав

Действующие вещества: Диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) - 4,00 г, хлорамфеникол - 0,75 г, Вспомогательные вещества: макрогол 1500 - 19,05 г, макрогол 400 - 76,2 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса. В случае необходимости пожалуйста проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Способ применения и дозы

Наружно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки которыми рыхло выполняют рану. Возможно введение препарата в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этом случае мазь предварительно подогревают до 35-36 °С. Перевязки производят ежедневно один раз в день до полного очищения раны от гнойно-некротических масс. При больших раневых поверхностях суточная доза мази в пересчете на хлорамфеникол не должна превышать 3 г. Длительность лечения зависит от тяжести и течения заболевания. Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах которые указаны в инструкции. В случае необходимости пожалуйста проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата детский возраст до 1 года (у новорожденных биотрансформация хлорамфеникола происходит более медленно чем у взрослых).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности возможно только в случае если польза для матери превышает риск для плода. В период лактации следует либо прекратить применение препарата либо кормление грудью.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожные высыпания). В этом случае применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

При нанесении на обширные участки кожи и длительных курсах лечения необходимо проводить клинический анализ крови. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Условия хранения

При температуре не выше 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.