Инструкция по применению
Левопронт Сироп 30 мг / 5 мл 120 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Италия
Производитель: Си Эс Си
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Леводропропизин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36



Описание

Противокашлевое средство периферического действия.

Действующее вещество

Леводропропизин

Состав

Активное вещество леводропропизин. Вспомогательные вещества сахароза - 400 мг, метилпарагидроксибензоат - 1.3 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0.2 мг, лимонной кислоты моногидрат - 9.6 мг, натрия гидроксид - 3.6 мг, ароматизатор вишневый - 2.5 мг, вода очищенная - до 1 мл. 120 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные. 200 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Иодоступность леводропропизина при приеме внутрь составляет более 75%. Леводропропизин после приема внутрь быстро абсорбируется и распределяется в организме человека. Связывание с белками плазмы крови незначительное (11-14%). Период полувыведения составляет 1-2 часа. Выводится почками как в неизменном виде, так и в виде метаболитов (конъюгированный леводропропизин и конъюгированный р-гидроксилеводропропизин). Через 48 часов экскреция леводропропизина и вышеуказанных метаболитов почками составляет около 35% При многократном введении препарата не отмечено изменения фармакокинетических показателей и кумуляции леводропропизина. Значительных изменений в фармакокинетическом профиле у детей, пожилых пациентов, пациентов с нарушениями функции почек легкой или средней степени тяжести не выявлено.

Показания

Симптоматическое лечение кашля.

Способ применения и дозы

Внутрь. В зависимости от возраста и массы тела разовая доза составляет 18-60 мг. Кратность приема - до 3 раз в сутки с интервалами не менее 6 ч. Длительность лечения не должна превышать 7 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к леводропропизину заболевания, связанные с бронхиальной гиперсекрецией снижение мукоцилиарной функции (Синдром Картагенера, цилиарная дискинезия) беременность, период грудного вскармливания детский возраст до 2 лет. С осторожностью у пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени тяжести (клиренс креатинина менее 35 мл/мин), с выраженными нарушениями функции печени, у пожилых пациентов, при одновременном приеме с седативными средствами, при сахарном диабете.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны иммунной системы аллергические и анафилактические реакции, отек век, ангионевротический отек. Со стороны психики раздражительность, вялость, изменения личности или расстройства личности. Со стороны нервной системы обмороки, неустойчивость походки, вертиго, тремор, парестезии, тонико-клонические судороги и малые эпилептические припадки. Со стороны органа зрения мидриаз, двусторонняя слепота. Со стороны сердечно-сосудистой системы ощущение сердцебиения, тахикардия, предсердная бигеминия, артериальная гипотензия. Со стороны дыхательной системы одышка, кашель, отек дыхательных путей. Со стороны пищеварительной системы боль в желудке, боль в животе, тошнота, рвота, диарея, глоссит, афтозный стоматит. Со стороны печени и желчевыводящих путей холестатический гепатит. Со стороны обмена веществ: гипогликемическая кома. Со стороны кожи и подкожных тканей крапивница, эритема, экзантема, зуд, кожные реакции, эпидермолиз. Со стороны костно-мышечной системы слабость в нижних конечностях Общие реакции общее недомогание, генерализованный отек, астения.

Взаимодействие с другими препаратами

Леводропропизин не усиливает фармакологический эффект препаратов, действующих на ЦНС (например, бензодиазепинов, алкоголя, фенитоина, имипрамина), не модифицирует действие пероральных антикоагулянтов (например, варфарина) и не влияет на гипогликемическое действие инсулина. Однако, у пациентов с индивидуальной повышенной чувствительностью, возможно угнетающее действие на ЦНС при одновременном приеме леводропропизина с седативными средствами. Клинические исследования не продемонстрировали каких-либо взаимодействий с препаратами, используемыми при лечении заболеваний бронхолегочной системы, такими как бета2-адреномиметики, метилксантины и их производные, ГКС, антибиотики, муколитические и антигистаминные средства.

Особые указания

С осторожностью применяют у пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени тяжести (клиренс креатинина менее 35 мл в мин), с выраженными нарушениями функции печени, у пожилых пациентов, при одновременном приеме с седативными средствами, при сахарном диабете. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Следует с осторожностью применять у пациентов, занимающихся потенциально опасными видами деятельности, требующими высокой скорости психомоторных реакций.

Условия хранения

Защищенном от света месте, беречь от детей.