
Инструкция по применению
Левосин Мазь для наружного применения 40 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диоксометилтетрагидропиримидин+Сульфадиметоксин+Тримекаин+Хлорамфеникол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36

Действующее вещество

Диоксометилтетрагидропиримидин+Сульфадиметоксин+Тримекаин+Хлорамфеникол

Состав

Хлорамфеникол 10 мг, сульфадиметоксин 40 мг, метилурацил 40 мг, тримекаин 30 мг.

Форма выпуска

Мазь

Показания

— гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной микрофлорой: ожоги, труднозаживающие язвы) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса.

Способ применения и дозы

Наружно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этом случае мазь предварительно подогревают до 35-36°С. Перевязки производят ежедневно, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.

Противопоказания

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Клинический опыт применения препарата Левосин; у беременных и кормящих женщин ограничен, поэтому применять Левосин; мазь, следует по показаниям врача, когда предполагаемая польза для матери будет превышать потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможны местные аллергические реакции (кожная сыпь).

Условия хранения

Беречь от детей