Инструкция по применению
Либексин Муко® сироп, 50 мг/мл, 200 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Франция
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Карбоцистеин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 50 мг/мл
Срок годности: 36

Описание

Либексин Муко® — это отхаркивающее и муколитическое средство на основе карбоцистеина, предназначенный для взрослых и подростков с 15 лет. Препарат способствует разжижению мокроты, восстановлению слизистой оболочки бронхов и усилению мукоцилиарного клиренса. Показан при острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, а также при воспалениях ЛОР-органов. • Для взрослых и подростков с 15 лет • Помогает облегчить кашель с трудноотделяемой мокротой • Может применяться при бронхите, астме, синусите, отите Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Либексин Муко® (РУ П N013994/02) - показания; противопоказания и т.д. см. в государственном реестре лекарственных средств

Действующее вещество

Карбоцистеин

Состав

Карбоцистеин 100 мг 2 г.Вспомогательные вещества: сахароза - 70 г, метилпарагидроксибензоат - 0.15 г, ванилин - 0.05 г, краситель пунцовый (Понсо 4R) (кошениль красная А (Е124)) - 0.005 г, ароматизатор малиновый - 1 мл, ароматизатор вишневый - 0.5 мл, натрия гидроксид - до pH 6.1-6.3, вода очищенная - до 100 мл. 1 мерная ложка сиропа (5 мл) содержит: 3.5 г сахарозы и 13 мг натрия.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Карбоцистеин быстро всасывается после приема внутрь, достигая Cmax уровня в сыворотке крови через 2 ч. Биодоступность низкая (менее чем 10% от принятой дозы) в результате возможного быстрого прохождения через печень. T1/2 около 2 ч. Выводится преимущественно почками вместе с метаболитами.

Показания

— острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся образованием вязкой, трудноотделяемой мокроты (трахеит, бронхит, трахеобронхит, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) и слизи (воспалительные заболевания среднего уха, носа и его придаточных пазух – ринит, средний отит, синусит)— подготовка больного к бронхоскопии или бронхографии.

Способ применения и дозы

Внутрь. 1 мерная ложка сиропа (5 мл) содержит 100 мг карбоцистеина. Дети в возрасте от 2 до 5 лет: 1 мерная ложка(5 мл) 2 раза/сут (200 мг/сут). Дети старше 5 лет: 1 мерная ложка (5 мл) 3 раза/сут (300 мг/сут). Лечение не должно продолжатся более 8 дней без консультации с врачом.

Противопоказания

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения— хронический гломеруфрит (в фазе обострения), цистит— беременность— детский возраст до 2 лет— повышенная чувствительность к карбоцистеину или другим компонентам препарата.С осторожностью язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, период лактации.

Условия хранения

В сухом месте