# Инструкция по применению
# Ликопид Таблетки 10 мг 10 шт




## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: СКОПИНФАРМ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Глюкозаминилмурамилдипептид
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 60

## Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с фаской и риской.

## Действующее вещество

Глюкозаминилмурамилдипептид

## Состав

Состав на 1 таблетку Действующее вещество: глюкозаминилмурамилдипептид (ГМДП) – 10,0 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат – 184,7 мг, сахароза (сахар) – 12,5 мг, крахмал картофельный – 40 мг, метилцеллюлоза – 0,3 мг, кальция стеарат – 2,5 мг.  

## Форма выпуска

Таблетки

**Показания**

Препарат применяется у взрослых в комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся вторичными иммунодефицитными состояниями: – острые и хронические гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей, включая гнойно-септические послеоперационные осложнения; – инфекции, передающиеся половым путем (папилломавирусная инфекция, хронический трихомониаз); – герпетическая инфекция (включая офтальмогерпес); – псориаз (включая псориатический артрит); – туберкулез легких.

**Способ применения и дозы**

Ликопид® применяют внутрь натощак, за 30 минут до еды. Пациентам пожилого возраста рекомендуется начинать лечение с половинных доз (1/2 от терапевтической), при отсутствии побочных эффектов повышая дозу препарата до необходимой терапевтической. При пропуске приема препарата, если прошло не более 12 часов от запланированного времени, Вы можете принять пропущенную дозу; в случае, если прошло более 12 часов от запланированного времени приема, необходимо принять только следующую по схеме дозу и не принимать пропущенную. Гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей острые и хронические, тяжелое течение, включая гнойно-септические послеоперационные осложнения: по 10 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней; Герпетическая инфекция (рецидивирующее течение, тяжелые формы): по 10 мг 1 раз в сутки в течение 6 дней; - при офтальмогерпесе: по 10 мг 2 раза в сутки в течение 3-х дней. После перерыва в 3 дня курс лечения повторяют. Инфекции, передающиеся половым путем (папилломавирусная инфекция, хронический трихомониаз): – при папилломавирусной инфекции: по 10 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней, – при хроническом трихомониазе: по 10 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней. Псориаз: по 10-20 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней и далее пять приемов через день по 10-20 мг 1 раз в сутки. При тяжелом течении псориаза и обширном поражении (включая псориатический артрит): по 10 мг 2 раза в сутки в течение 20 дней. Туберкулез легких: по 10 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней.

**Противопоказания**

- повышенная чувствительность к глюкозаминилмурамилдипептиду и другим компонентам препарата; - беременность и грудное вскармливание; дети в возрасте до 18-ти лет; - аутоиммунный тиреоидит в фазе обострения; - состояния, сопровождающиеся фебрильной температурой (>38°C) на момент приема препарата; - редко встречающиеся врожденные нарушения обмена веществ: алактазия, галактоземия, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; - применение при аутоиммунных заболеваниях не рекомендуется вследствие отсутствия клинических данных.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Прием препарата Ликопид® 10 мг противопоказан женщинам в период беременности и грудного вскармливания.

**Побочные действия**

Часто (1-10%) – артралгии (боли в суставах), миалгии (боли в мышцах); в начале лечения может отмечаться кратковременное повышение температуры тела до субфебрильных значений (до 37,9°C), что не является показанием к отмене препарата. Чаще всего вышеописанные побочные эффекты наблюдается при приеме таблеток Ликопид® в высоких дозах (20 мг). Редко (0,01-0,1%) – повышение температуры тела до фебрильных значений (>38,0°C). При повышении температуры тела больше 38,0°C возможен прием жаропонижающих средств, что не снижает фармакологических эффектов таблеток Ликопид®. Очень редко (меньше 0,01%) – диарея. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом лечащему врачу.

**Передозировка**

Случаи передозировки препарата неизвестны. Исходя из фармакологических свойств препарата, в случае его передозировки может наблюдаться подъем температуры тела до субфебрильных (до 37,9°C) значений. При необходимости проводится симптоматическая терапия (жаропонижающие средства), назначаются сорбенты. Специфический антидот неизвестен.  

**Взаимодействие с другими препаратами**

Препарат повышает эффективность противомикробных препаратов, отмечается синергизм в отношении противовирусных и противогрибковых препаратов. Антациды и сорбенты значительно снижают биодоступность препарата. Глюкокортикостероиды снижают биологический эффект Ликопида®.

**Особые указания**

В начале приема Ликопида® 10 мг возможно обострение симптомов хронических и латентно-протекающих заболеваний, связанное с основными фармакологическими эффектами препарата. У лиц пожилого возраста Ликопид® 10 мг применяется с осторожностью, строго под контролем врача. Пациентам пожилого возраста рекомендуется начинать лечение с половинных доз (1/2 от терапевтической), при отсутствии побочных эффектов повышая дозу препарата до необходимой терапевтической. Решение о назначение препарата Ликопид® таблетки 10 мг пациентам с сочетанием диагнозов «псориаз» и «подагра» должен принимать врач при оценке соотношения риск/польза, вследствие наличия потенциального риска обострения подагрического артрита и отека сустава. В случае принятия врачом решения о назначении Ликопид® таблетки 10 мг в ситуации сочетания у пациента диагнозов «псориаз» и «подагра», лечение следует начинать с низких доз, при отсутствии побочных эффектов, повышая дозу до терапевтической. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Не влияет на способность управлять транспортными средствами и сложными механизмами.

**Условия хранения**

В сухом месте