Инструкция по применению
Эвалар ЛимфоТранзит Концентрат напитка 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Концентрат
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Состав

Экстракт крапивы и плодоножек вишни жидкий, глицерин растительный (загуститель), лимонная кислота (регулятор кислотности), зеленого чая экстракт, ароматизатор «Ромашка», лимонный сок порошкообразный, сокосодержащая основа «Грейпфрут», кукурузных рылец экстракт, коры ункарии экстракт, колер карамельный (краситель), бензоат натрия и сорбат калия (консерванты), алоэ экстракт, сукралоза (подсластитель). Содержание в 20 мл (суточном приеме): Крапивы и плодоножек вишни экстракт жидкий - 15750 мг Зеленого чая экстракт - 220 мг Лимонный сок порошкообразный - 100 мг Сокосодержащая основа « Грейпфрут» - 100 мг Кукурузных рылец экстракт - 76 мг Коры ункарии экстракт - 44 мг Алоэ экстракт (в том числе гидроксиантраценовые производные в пересчете на алоин), не менее - 28 мг Танины из комплекса растений, не менее - 60 мг

Форма выпуска

Концентрат

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника дубильных веществ, содержащей антрахиноны, способствующей улучшению движения лимфы и очищению организма от токсинов, уменьшению отеков.

Способ применения и дозы

Перед приготовлением напитка содержимое флакона встряхнуть. 1 чайную ложку (5 мл) концентрата напитка растворить в 1 стакане (250 мл) воды. Принимать взрослым 4 стакана в день. Допускается дневную дозу концентрата напитка – 4 чайные ложки (20 мл) – растворить в 1 литре воды и принимать в течение дня. Продолжительность приема – 10 дней. На курс –2 флакона. Рекомендуется повторять прием 4 раза в год (каждый сезон).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение добавки в период беременности и при кормлении грудью противопоказано.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.