Инструкция по применению
Линекс Форте Капсулы 42 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бифидобактерии+Лактобактерии
Количество в упаковке: 42

Описание

Капсулы с белым корпусом и желтой крышечкой. Содержимое капсулы: порошок от светло-бежевого до светло-розового цвета с темными вкраплениями.

Действующее вещество

Бифидобактерии+Лактобактерии

Состав

Препарат Линекс® Форте содержит: Действующим веществом является порошок Пробио-тек АБ Бленд 64 (Probio-tec® AB Blend 64), содержащий _Lactobacillus acidophilus_ (CHR. HANSEN LA-5®) и _Bifidobacterium animalis subsp. lactis_ (CHR. HANSEN BB-12®). Общее количество живых лиофилизированных бактерий не менее 2 x 109 КОЕ. Каждая капсула содержит 60 мг порошка Пробио-тек АБ Бленд 64 (Probio-tec® AB Blend 64), содержащего 25,74 мг _Lactobacillus_ _acidophilus_ (CHR. HANSEN LA-5®) и 3,06 мг _Bifidobacterium animalis subsp. lactis_ (CHR. HANSEN BB-12®). Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: _содержимое_ _капсулы__:_ Бенео® Синерджи 1 (Beneo® Synergy 1) (инулин, олигофруктозы (декстроза + фруктоза + сахароза), мальтодекстрин, магния стеарат), _состав_ _корпуса_ _капсулы__:_ титана диоксид (E171), гипромеллоза, _состав_ _крышечки_ _капсулы__:_ титана диоксид (E171), железа оксид желтый (E172), гипромеллоза. Препарат Линекс® Форте содержит декстрозу, фруктозу и сахарозу (см. раздел 2).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Линекс® Форте показан к применению у взрослых и детей с 0 лет: \- Для лечения и профилактики дисбактериоза кишечника. Дисбактериоз кишечника проявляется следующими симптомами: диарея (понос), нарушение пищеварения (диспепсия), запоры, вздутие живота (метеоризм), тошнота, отрыжка, рвота, боли в животе, возможны аллергические кожные реакции. \- В комплексной терапии и для профилактики диареи, метеоризма и других нарушений пищеварения, вызванных: * вирусными и бактериальными инфекциями желудочно-кишечного тракта (например, ротавирусные инфекции, диарея путешественника), * терапией антибиотиками широкого спектра действия и другими противомикробными препаратами, * лучевой терапией органов брюшной полости и малого таза. Линекс® Форте показан к применению у взрослых и детей с 12 лет: * для облегчения запоров, * как дополнение к стандартному лечению, направленному на уничтожение инфекции _Helicobacter_ _pylori_ (эрадикационной терапии).

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. **Рекомендуемая доза** Лечение и профилактика дисбактериоза, в комплексной терапии и для профилактики диареи, метеоризма и других нарушений пищеварения_,_ вызванных вирусными и бактериальными инфекциями желудочно-кишечного тракта, терапией антибиотиками широкого спектра действия и другими противомикробными препаратами, лучевой терапией органов брюшной полости и малого таза: _Взрослые и подростки старше 12 лет:_ по 1 капсуле 1-3 раза в день (в зависимости от тяжести симптомов). Дополнение к стандартной эрадикационной терапии _Helicobacter_ _pylori_ и для облегчения запоров: _Взрослые и подростки старше 12 лет:_ по 1 капсуле 3 раза в день. Препарат Линекс® Форте можно принимать до исчезновения симптомов. Не превышайте рекомендованные ежедневные дозы препарата. **Применение у детей и подростков** _Дети от 2 до 12 лет:_ по 1 капсуле 1-2 раза в день (в зависимости от тяжести симптомов). _Новорожденные и дети до 2-х лет:_ по 1 капсуле 1 раз в день. Если Ваш ребенок младше 6 лет, то диарею необходимо лечить под наблюдением врача. Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма. **Путь и (или) способ введения** Препарат предназначен для приема внутрь. Принимайте капсулы Линекс® Форте предпочтительно во время или после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Если Вы или Ваш ребенок не можете проглотить целую капсулу Линекс® Форте, вскройте капсулу, высыпьте содержимое в ложку и смешайте с небольшим количеством жидкости. **Если Вы забыли принять препарат Линекс® Форте** Примите пропущенную дозу препарата Линекс® Форте, как только вспомните, кроме тех случаев, когда приближается время приема следующей дозы. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенный прием препарата. При наличии вопросов по применению препарата проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или работником аптеки. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Линекс® Форте: * если у Вас или Вашего ребенка имеется аллергия на действующие вещества или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Сообщений о нежелательных явлениях при применении препарата Линекс® Форте во время беременности и в период грудного вскармливания не поступало. Если Вы беременны или кормите грудью в случае возникновения острой диареи соблюдайте меры предосторожности во избежание развития дефицита жидкости и электролитов в организме и других нежелательных явлений, независимо от приема препарата Линекс® Форте, потому что острая диарея может стать угрозой Вашему здоровью и здоровью плода. Если Вы беременны или кормите грудью, то лечение диареи необходимо проводить под наблюдением врача. Нет данных

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Линекс® Форте может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Сообщений о нежелательных эффектах нет, однако могут отмечаться реакции гиперчувствительности. **Сообщение о нежелательных реакциях** Если у Вас или Вашего ребенка возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства - члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Линекс® Форте больше, чем следовало Данных о симптомах передозировки нет. Если после превышения дозы у Вас возникли нежелательные реакции, пожалуйста, обратитесь к Вашему лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Нежелательного взаимодействия с другими лекарственными средствами не отмечено. При одновременном применении с антибиотиками рекомендуется принимать препарат Линекс® Форте не ранее, чем через 3 часа после приема антибиотиков. **Препарат Линекс® Форте с напитками и алкоголем** Не следует запивать препарат Линекс® Форте горячими напитками и принимать одновременно с алкоголем.

Особые указания

При приеме препарата Линекс® Форте важно помнить о следующем: * при лечении диареи необходимо возмещение потерянной жидкости и электролитов, * при наличии запоров Вам рекомендуется соблюдать сбалансированную диету, обеспечивающую поступление достаточного количества клетчатки и жидкости, соблюдать режим физической активности и стараться опорожнять кишечник в одно и то же время каждый день. Если запор длится более семи дней, Вам необходимо проконсультироваться с врачом. **Дети и подростки** Если Вашему ребенку меньше 6 лет, диарею необходимо лечить под наблюдением врача. Прием целых капсул препарата Линекс® Форте у детей в возрасте до 1 года не рекомендуется. Для данной возрастной группы рекомендуется вскрыть капсулу, содержимое высыпать в ложку и смешать с небольшим количеством жидкости или выбрать более удобные для приема формы выпуска. **Препарат Линекс® Форте содержит декстрозу, фруктозу и сахарозу** Если у Вас или Вашего ребенка непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Если у Вас или Вашего ребенка сахарный диабет, следует учитывать наличие в составе препарата простых сахаров. **Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.** * Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. * Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. * Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки. * Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша. * Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу. Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке (блистер в пачке) при температуре не выше 25 °С. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.