Инструкция по применению
Линекс для детей Капли для приема внутрь 8 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Словения
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

БАД к пище, источник пробиотических микроорганизмов. В состав пробиотика входят важные для ребенка бифидобактерии Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12). Бифидобактерии содержатся в грудном молоке и начинают заселять кишечник новорожденного с первых часов жизни. Штамм Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12) обладает высокой безопасностью, хорошей переносимостью и клинической эффективностью у детей с периода новорожденности. Бифидобактерии способствуют естественному формированию нормальной микрофлоры и функции кишечника, а также создают оптимальную среду в кишечнике для действия пищеварительных ферментов. Кроме того, бифидобактерии обеспечивают правильное формирование иммунитета и помогают снизить риск развития инфекционных заболеваний, возможность проявления атопического дерматита и пищевой аллергии у детей раннего возраста. У детей на грудном вскармливании именно бифидобактерии составляют 60-91% микрофлоры.

Состав

Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12) - 1 суточная доза не менее 1.0×109 КОЕ. Масло подсолнечное (масло подсолнечное, антиокислители DL-альфа токоферол и лимонная кислота), лиофилизированные бифидобактерии (Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12), сахароза, мальтодекстрин, антиокислитель аскорбат натрия).

Форма выпуска

Капли

Показания

Установление и поддержание равновесия состава и функционального состояния микрофлоры кишечника, в т.ч. у детей первого года жизни, при таких пищеварительных расстройствах как колики, образование газа, нарушение стула (запор, диарея) и других пищеварительных расстройствах; поддержание равновесия состава и функционального состояния микрофлоры кишечника при приеме антибиотиков и после окончания курса лечения антибиотиками; снижение риска диареи, вызванной вирусными или бактериальными инфекциями ЖКТ (включая ротавирусную инфекцию); поддержание формирования и функционирования иммунной системы; профилактика атопического дерматита у детей.

Способ применения и дозы

Детям с рождения - по 6 капель в сутки во время еды. Капли можно добавлять в молоко, молочные или другие негорячие напитки. Перед употреблением хорошо встряхнуть. Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. При одновременном назначении с антибиотиками принимать не ранее, чем через 3 часа после применения антибиотиков. Принимать по согласованию с врачом-педиатром. Продолжительность приема: 28 дней. Возможен повторный прием в течение года.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном назначении с антибиотиками принимать не ранее, чем через 3 часа после применения антибиотиков. Принимать по согласованию с врачом-педиатром.

Особые указания

Перед употреблением хорошо встряхнуть. Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Рекомендуемая продолжительность приема – 28 дней. Возможен повторный прием в течение года.

Срок хранения после открытия

28 дней – во вскрытой упаковке

Условия хранения

В сухом месте