Инструкция по применению
Линекс Капсулы 32 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Словения
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бифидобактерии+Лактобактерии
Количество в упаковке: 32
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Бифидобактерии+Лактобактерии

Состав

1 капсула содержит: Лебенин, порошок (В 1 г порошка содержится смесь биомассы живых бактерий вида L. acidophilus (sp. L. gasseri) не менее 4,5 х 107 КОЕ, вида B. infantis не менее 3,0 х 107 КОЕ, вида E. faecium не менее 4,5 х 107 КОЕ) – 5,04 мг. Общее количество живых лиофилизированных бактерий не менее 1,2 х 107 КОЕ/кап. вспомогательные вещества: лактоза – 98,28 мг, декстрин – 13,16 мг, крахмал картофельный – до 280,00 мг (в составе субстанции Лебенин) магния стеарат # 8,40 мг оболочка капсулы # титана диоксид (Е 171) – 2,00 %, желатин – до 100 %.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Лечение и профилактика дисбактериоза кишечника. Дисбактериоз кишечника проявляется следующими симптомами: диарея (понос), диспепсия (нарушение пищеварения), запоры, метеоризм (вздутие живота), тошнота, отрыжка, рвота, боли в животе, возможны аллергические кожные реакции. • Облегчение запоров у взрослых и детей старше 12 лет. • Дополнение к стандартной эрадикационной терапии Helicobacter pylori у взрослых и детей старше 12 лет. • В комплексной терапии и для профилактики диареи, метеоризма и других нарушений пищеварения, вызванных: - вирусными и бактериальными инфекциями желудочно-кишечного тракта (например, ротавирусные инфекции, диарея путешественника) - терапией антибиотиками широкого спектра действия и другими противо микробными препаратами - лучевой терапией органов брюшной полости и малого таза

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 2 капсулы 3 раза в день. Линексследует принимать после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Пациентам, которые не могут проглотить целую капсулу, ее необходимо вскрыть, содержимое высыпать в ложку и смешать с небольшим количеством жидкости. Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма.

Противопоказания

гиперчувствительность к компонентам препарата непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Ввиду недостаточного количества данных по безопасности применения у беременных и кормящих женщин в качестве меры предосторожности прием препарата Линекс® при беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется. Лечение диареи во время беременности и в период грудного вскармливания следует проводить под медицинским наблюдением.

Побочные действия

Препарат хорошо переносится. Сообщений о нежелательных эффектах нет, однако нельзя исключить возможность возникновения реакций гиперчувстви- тельности.

Передозировка

Данных о симптомах передозировки нет.

Взаимодействие с другими препаратами

Нежелательного взаимодействия с другими лекарственными средствами не отмечено. Состав препарата позволяет принимать Линекс® в комбинации с любыми лекарственными средствами, но желательно не в один прием. Для повышения эффективности желательно принимать препарат Линекс® не ранее чем через три часа после приема антибиотиков или химиотерапевтических препаратов.

Особые указания

Не следует запивать препарат Линекс горячими напитками и принимать одновременно с алкоголем. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед приемом препарата, если у Вас: - температура тела выше 38° С, - следы крови или слизи в стуле, - диарея длится более двух дней и/или сопровождается острыми болями в животе, обезвоживанием и потерей веса, - хронические заболевания (например, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы) или состояния, сопровождающиеся иммунодефицитом (например, ВИЧ-инфекция). При лечении диареи необходимо возмещение потерянной жидкости и электролитов.

Условия хранения

Беречь от детей