Инструкция по применению
Линекс капсулы 48 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Словения
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бифидобактерии+Лактобактерии
Количество в упаковке: 48
Срок годности: 24



Действующее вещество

Бифидобактерии+Лактобактерии

Состав

Действующее вещество: ЛебенинКонцентрация действующего вещества (мг): 280

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике не предоставлены.

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь после еды, капсулы следует запивать небольшим количеством жидкости. Детям в возрасте до 3 лет и пациентам, которые не могут проглотить капсулу, следует вскрыть ее, высыпать содержимое в ложку и смешать с небольшим количеством жидкости.Новорожденным и детям в возрасте до 2 лет назначают по 1 капсуле 3 раза/сут.Детям в возрасте от 2 до 12 лет - по 1-2 капсулы 3 раза/сут.Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 2 капсулы 3 раза/сут. Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата или к молочным продуктам.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не следует запивать Линекс горячими напитками и принимать одновременно с алкоголем.Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед приемом препарата, если у пациента:- температура тела выше 38 °С;- следы крови или слизи в стуле;- диарея длится более двух дней и сопровождается острыми болями в животе, обезвоживанием и потерей веса;- хронические заболевания (сахарный диабет, СПИД). При лечении диареи необходимо возмещение потерянной жидкости и электролитов. Влияние на способности к концентрации внимания. Линекс не оказывает влияния на психофизическую активность.

Побочные действия

Нежелательного взаимодействия с другими ЛС не отмечено. Состав препарата позволяет принимать Линекс одновременно с другими ЛС, включая антибиотики и химиотерапевтические препараты.

Передозировка

Препарат хорошо переносится. Сведений о нежелательных реакциях нет, однако нельзя исключить возможность развития реакций повышенной чувствительности.

Взаимодействие с другими препаратами

Меры предосторожности

Особые указания

Данных о симптомах передозировки нет.

Условия хранения

Беречь от детей