Инструкция по применению
Линкас БСС Раствор для приема внутрь 120 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Пакистан
Производитель: Herbion
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фитопрепарат с отхаркивающим действием
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36



Описание

Линкас БСС раствор – оригинальный растительный лекарственный препарат без содержания сахара с отхаркивающим, муколитическим и противовоспалительным действием. Рекомендован для пациентов с нарушением обмена глюкозы и/или следящих за весом. Вязкая жидкость коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие незначительного осадка, исчезающего при взбалтывании.

Действующее вещество

Фитопрепарат с отхаркивающим действием

Состав

10 мл раствора содержит: Адатоды сосудистой листьев 600,0 мг; Солодки голой корней 75,0 мг; Перца длинного плодов и корней 100,0 мг; Фиалки душистой цветков 25,0 мг; Иссопа лекарственного листьев 50,0 мг; Альпинии галанги корней и корневищ 50,0 мг; Кордии широколистной плодов 100,0 мг; Алтея лекарственного цветков 100,0 мг; Зизифуса настоящего плодов 100,0 мг; Оносмы прицветковой листьев и цветков 100,0 мг. Вспомогательные вещества: Пропиленгликоль, натрия сахарин, сорбита раствор (Е 420), глицерин, лимонная кислота, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), масло мяты перечной, масло гвоздичное, вода очищенная.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Поскольку Линкас БСС является многокомпонентным растительным препаратом, изучение его фармакокинетики не представляется возможным.

Показания

Симптоматическая терапия инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделимой мокротой (на фоне острых респираторных заболеваний, гриппа, трахеита, бронхита, трахеобронхита, пневмонии,бронхита «курильщиков» и других воспалительных заболеваний дыхательных путей).

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым по 2 чайные ложки 3-4 раза в день. Длительность применения 5-7 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Тяжёлые нарушения функции печени и почек. Беременность. Период грудного вскармливания. Возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием до настоящего времени достаточных исследований Линкас не рекомендуется применять при беременности. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Редко: аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами уменьшающими образование мокроты.

Условия хранения

В сухом месте