Инструкция по применению
Линкас Лор Пастилки мятные 16 шт

Характеристики

Форма выпуска: Пастилки
Страна: Пакистан
Производитель: Herbion
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фитопрепарат с отхаркивающим действием
Количество в упаковке: 16



Описание

Фитопрепарат с отхаркивающим и противовоспалительным действием

Действующее вещество

Фитопрепарат с отхаркивающим действием

Состав

В 1 пастилке Линкас® Лор содержится: Активные компоненты: Адатоды сосудистой листьев экстракт сухой (Adhatoda vasica Nees.) 30 мг, Солодки голой корней экстракт сухой (Glycyrrhiza glabra L.) 7 мг, Перца длинного плодов и корней экстракт сухой (Piper longum L.) 6 мг, Фиалки душистой цветков экстракт сухой (Viola odorata L.) 2 мг, Иссопа лекарственного листьев экстракт сухой (Hyssopus officinalis L.) 3 мг, Альпинии галанга корневищ экстракт сухой (Alpinia galanga L.) 3 мг. Вспомогательные вещества: - пастилки мятные: левоментол 4 мг, сахароза 1,54 г, декстроза жидкая [декстроза, олиго- и полисахариды] 850 мг, эвкалиптовое масло 3 мг, мяты перечной масло 2 мг, тальк 12 мг, парафин твёрдый 1 мг, воск пчелиный желтый 1 мг, ланолин 1 мг, парафин белый мягкий 0,6 мг, парафин жидкий 4,4 мг.

Форма выпуска

Пастилки

Фармакокинетика

Поскольку Линкас® Лор является многокомпонентным растительным препаратом, изучение его фармакокинетики не представляется возможным.

Показания

Симптоматическая терапия заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Взрослым следует медленно рассасывать в полости рта по 1 пастилке каждые 2-3 часа. Максимальная суточная доза - 8 пастилок. Средний курс лечения - 3-7 дней.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания. Дефицит сахаразы /изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не рекомендуют применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки описано не было.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Особые указания

Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В одной пастилке содержится количество углеводов, соответствующее 0,18 ХЕ. Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами: Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и др. транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т. п.).