Инструкция по применению
Линкас сироп 120 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Пакистан
Производитель: Herbion
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фитопрепарат с отхаркивающим действием
Количество в упаковке: 1



Описание

Сироп коричневого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Фитопрепарат с отхаркивающим действием

Состав

10 мл сиропа содержат:Активные компоненты: Адхатоды сосудистой листьев экстракт сухой (Adhatoda vasica Ness.) 600 мг, Солодки голой корней экстракт сухой (Glycyrrhyza glabra L.) 75 мг, Перца длинного плодов и корней экстракт сухой (Piper longum L.) 100 мг, Фиалки душистой цветков экстракт сухой (Viola odorata L.) 25 мг, Иссопа лекарственного листьев экстракт сухой (Hyssopus officinalis L.) 50 мг, Альпинии галанга корней и корневищ экстракт сухой (Alpinia galanga (L.) Willd) 50 мг, Кордии широколистной плодов экстракт сухой (Cordia latifolia) 100 мг, Алтея лекарственного цветков экстракт сухой (Altea officinalis L.) 100 мг, Зизифуса настоящего плодов экстракт сухой (Zizyphus tujuba Mill.) 100 мг, Оносмы прицветковой листьев и цветков экстракт сухой (Onosma bracteatum Wall.) 100 мг.Вспомогательные вещества: сахароза, кислота лимонная безводная, глицерин, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, масло мяты перечной, масло гвоздичное, вода очищенная.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Симптоматическая терапия инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (на фоне острых респираторных заболеваний, гриппа, трахеита, бронхита, трахеобронхита, пневмонии, бронхита «курильщиков» и других воспалительных заболеваний дыхательных путей).

Способ применения и дозы

Внутрь, дети от 6-ти месяцев до 3-х лет - по ½ чайной ложке (2,5 мл) 3 раза в день,от 3 лет до 8 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в день,от 8 до 18 лет - по 1 чайной ложке 4 раза в день,взрослые - по 2 чайные ложки 3-4 раза в день.Длительность применения препарата 5-7 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 6 месяцев. С осторожностью: сахарный диабет.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием до настоящего времени достаточных исследований препарат не рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания.

Побочные действия

Редко - аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Особые указания

Сироп содержит сахарозу (70%), что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также находящимся на гипокалорийной диете.

Условия хранения

При температуре не выше 25°С в недоступном для детей месте.