Инструкция по применению
Линкас Сироп 150 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Пакистан
Производитель: Herbion
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фитопрепарат с отхаркивающим действием
Количество в упаковке: 1

Описание

Линкас – это лекарственный препарат, разработанный на основе активных компонентов растительного происхождения, обладает спазмолитическим, жаропонижающим, муколитическим и противовоспалительным действием. В результате применения Линкаса усиливается активность желез секреции и увеличивается двигательная активность ворсинок эпителия. Из-за повышения отхождения мокроты, в результате применения препарата, снижается частота кашля и облегчается дыхание. Активные компоненты препарата снижают раздражение слизистой оболочки дыхательных путей путем местного анестезирующего действия. Лучше всего эффект действия препарата наступает спустя 2-4 дня, после начала приема.

Действующее вещество

Фитопрепарат с отхаркивающим действием

Состав

10 мл содержат: Активные вещества: адхатоды сосудистой листьев экстракт сухой (Adhatoda vasica Ness.) 600 мг, солодки голой корней экстракт сухой (Glycyrrhiza glabra L.) 75 мг, перца длинного плодов и корней экстракт сухой (Piper longum L.) 100 мг, фиалки душистой цветков экстракт сухой (Viola odorata L.) 25 мг, иссопа лекарственного листьев экстракт сухой (Hyssopus officinalis L.) 50 мг, альпинии галанга корней и корневищ экстракт (Alpinia galanga L.) 50 мг, кордии широколистной плодов экстракт сухой (Cordia latifolia) 100 мг, алтея лекарственного цветков экстракт сухой (Althaea officinalis L.) 100 мг, зизифуса настоящего плодов экстракт сухой (Ziziphus jujuba Mill.) 100 мг, оносмы прицветковой листьев и цветков экстракт сухой (Onosma bracteatum Wall.) 100 мг; Вспомогательные вещества: сахароза; лимонная кислота безводная; глицерин; метилпарагидроксибензоат; пропилпарагидроксибензоат; пропиленгликоль; мяты перечной масло; гвоздичное масло; вода очищенная.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Симптоматическая терапия инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (на фоне ОРВИ, гриппа, трахеита, бронхита, трахеобронхита, пневмонии, бронхита курильщика и других воспалительных заболеваний дыхательных путей).

Способ применения и дозы

Линкас принимают внутрь. Детям от 6 мес до 3 лет — по 1/2 ч.ложки (2,5 мл) 3 раза в день, 3-8 лет — по 1 ч. ложке (5 мл) 3 раза в день, 8-18 лет — по 1 ч. ложке 4 раза в день, взрослым — по 2 ч. ложки 3-4 раза в день.Длительность применения препарата — 5-7 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам Линкаса. Детский возраст до 6 мес.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием до настоящего времени достаточных исследований Линкас не рекомендуется применять при беременности. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Редко — аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки не зафиксированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами уменьшающими образование мокроты.

Особые указания

Сироп содержит сахарозу, что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В одной разовой дозе (10 мл) содержится около 7 г сахарозы, что соответствует 0,58 ХЕ.