Инструкция по применению
Линкас Сироп 90 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Пакистан
Производитель: Herbion
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фитопрепарат с отхаркивающим действием
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Описание

Вязкая жидкость коричневого цвета, с характерным запахом.

Действующее вещество

Фитопрепарат с отхаркивающим действием

Состав

10 мл сиропа содержат: Активные компоненты: Адатоды сосудистой листьев экстракт сухой (Adhatoda vasica Ness.) 600 мг, Солодки голой корней экстракт сухой (Glycyrrhyza glabra L.) 75 мг, Перца длинного плодов и корней экстракт сухой (Piper longum L.) 100 мг, Фиалки душистой цветков экстракт сухой (Viola odorata L.) 25 мг, Иссопа лекарственного листьев экстракт сухой (Hyssopus officinalis L.) 50 мг, Альпинии галанги корней и корневищ экстракт сухой (Alpinia galanga (L.) Willd) 50 мг, Кордии широколистной плодов экстракт сухой (Cordia latifolia) 100 мг, Алтея лекарственного цветков экстракт сухой (Althea officinalis L.) 100 мг, Зизифуса настоящего плодов экстракт сухой (Zizyphus jujuba Mill.) 100 мг, Оносмы прицветковой листьев и цветков экстракт сухой (Onosma bracteatum Wall.) 100 мг. Вспомогательные вещества: сахароза 7 г, кислота лимонная безводная 100 мг, глицерин 2 мг, метилпарагидроксибензоат 10 мг, пропилпарагидроксибензоат 2 мг, пропиленгликоль 0,01 мл, мяты перечной масло 3,75 мкл, гвоздики цветков масло 1,25 мкл, вода очищенная до 10 мл.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Поскольку Линкас, сироп является многокомпонентным растительным препаратом, изучение его фармакокинетики не представляется возможным.

Показания

Симптоматическая терапия инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (на фоне острых респираторных заболеваний, гриппа, трахеита, бронхита, трахеобронхита, пневмонии, бронхита "курильщиков" и других воспалительных заболеваний дыхательных путей).

Способ применения и дозы

Внутрь, дети от 6-ти месяцев до 3-х лет - по 1/2 чайной ложке (2,5 мл) 3 раза в день, от 3 лет до 8 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в день, от 8 до 18 лет - по 1 чайной ложке 4 раза в день, взрослые - по 2 чайные ложки 3-4 раза в день. Длительность применения препарата 5-7 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 6 месяцев, беременность и период грудного вскармливания, дефицит сахаразы /изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки не зафиксированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Особые указания

Сироп содержит сахарозу, что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В одной разовой дозе (10 мл) содержится около 7 г сахарозы, что соответствует 0,58 ХЕ. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и др. транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т. п.).

Условия хранения

В сухом месте