Инструкция по применению
Линкомицин Капсулы 250 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Промед
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Линкомицин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 250 мг

Описание

Линкомицин – антибиотик широкого спектра действия, который применяется для лечения заболеваний, спровоцированных активностью большинства грамположительных бактерий. При приеме терапевтических доз препарата он действует бактериостатически, а в более высоких концентрациях оказывает на организм выраженное бактерицидное действие.

Действующее вещество

Линкомицин

Состав

Линкомицина гидрохлорид (в пересчете на линкомицин) - 0,25 г

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После приема внутрь всасывается 20—30% принятой дозы линкомицина. Максимальная концентрация в крови достигается через 2—4 ч. Проникает в разные органы и ткани, в том числе в костную ткань, в желчь. Через гематоэнцефалический барьер проникает плохо, однако проницаемость ГЭБ повышается при менингите. Метаболизируется в печени. Выводится с мочой и фекалиями.

Показания

Согласно инструкции к Линкомицину, препарат назначают в следующих случаях: - для лечения инфекционных заболеваний ЛОР-органов и дыхательных путей, вызванных чувствительными к антибиотику микроорганизмами (в т.ч. отита, бронхита, фарингита, трахеита, синусита, пневмонии, абсцесса легкого и др.), - при инфекционных заболеваниях костей и суставов, спровоцированных активностью чувствительных к препарату микроорганизмов, - для лечения инфекционных болезней кожного покрова и мягких тканей, вызванных чувствительными к Линомицину микроорганизмами (в т.ч. инфицированных гнойных ран, фурункулеза, абсцесса, панариция, рожи и мастита). В стоматологии Линкомицин применяют при различных инфекциях челюстно-лицевого аппарата. Основным преимуществом этого препарата по сравнению с другими антибиотиками является его способность депонироваться в зубах и костной ткани. Зачастую Линкомицин в стоматологии применяют в комплексе с лидокаином для ликвидации гнойных процессов при пародонтите, периодонтите и гингивите. Также Линкомицин в стоматологии эффективен при необходимости избежать присоединения вторичных инфекций на поверхности раны после экстракции зуба. Так как прямых указаний в инструкции о необходимости использования Линкомицина в стоматологии нет, вопрос о возможности его применения следует решать с врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 1-2 ч до или через 2-3 ч после еды, 2-3 раза в день с интервалом 8-12 часов.Для взрослых суточная доза - 1-1,5 г, разовая - 0,5 г.Для детей в возрасте от 3 до 14 лет суточная доза - 30-60 мг/кг.Продолжительность лечения в зависимости от формы и тяжести заболевания составляет 7-14 дней (при остеомиелите - 3 нед. и более).При длительных или повторных курсах лечение следует проводить под контролем функции печени и почек.

Противопоказания

- Гиперчувствительность,- беременность (за исключением случаев, когда это необходимо по "жизненным" показаниям),- период лактации,- тяжелая печеночная и /или почечная недостаточность,- детский возраст (до 3 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота , диарея, боли в эпигастрии, боль в животе, глоссит, стоматит, транзиторная гипербилирубинемия, повышение активности "печеночных" трансаминаз, при длительном применении - кандидоз желудочно-кишечного тракта, псевдомембранозный энтероколит . Другие грибковые инфекции генитального тракта.Со стороны органов кроветворения: обратимые лейкопения, тромбоцитопения, нейтропения.Аллергические реакции: крапивница, эксфолиативный дерматит, ангионевротический отек, анафилактический шок.

Передозировка

Нет данных о передозировке препарата.

Особые указания

На фоне длительного лечения необходим периодический контроль активности "печеночных" трансаминаз и функции почек.Назначение пациентам с печеночной недостаточностью допустимо лишь по "жизненным" показаниям.При появлении признаков псевдомембранозного энтероколита (диарея, лейкоцитоз, лихорадка, боль в животе, выделение с каловыми массами крови и слизи) в легких случаях достаточно отмены препарата и назначения ионообменных смол (колестирамин), в тяжелых случаях показано возмещение потери жидкости, электролитов и белка, ванкомицин - внутрь, в суточной дозе 0,5-2 г (за 3-4 приема) в течение 10 дней или бацитрацин.