Инструкция по применению
Лиотон 1000 Гель 100 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Италия
Производитель: Berlin-Chemie
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гепарин натрия
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60.0



Действующее вещество

Гепарин натрия

Состав

В 100 г геля содержится: гепарин натрия 100 000 МЕ. Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат - 0.12 г, пропилпарагидроксибензоат - 0.03 г, карбомер 940 - 1.25 г, этиловый спирт 96% (этанол) - 30 мл, неролиевое масло - 0.05 г, лавандовое масло - 0.05 г, триэтаноламин (троламин) - 0.85 г, вода очищенная - до 100 г.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Cmax в крови достигается через 8 ч после аппликации и возвращается к исходному уровню через 12-24 ч. Выводится в основном с мочой.

Показания

Тромбофлебиты поверхностных вен, флеботромбоз; осложнения после хирургических операций на венах; локализованные инфильтраты и отеки; травмы, ушибы (в т.ч. мышечной ткани, сухожилий, суставов); подкожные гематомы.

Способ применения и дозы

На кожу в области поражения наносят 3-10 см геля 1-3 раза/сутки и осторожно втирают.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к гепарину.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по строгим показаниям.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка

Передозировка; маловероятна в связи с низкой абсорбцией компонентов геля.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие Лиотона 1000 не описано.

Особые указания

Препарат не следует применять при кровотечениях, а также на открытых ранах, на слизистых оболочках и при гнойных процессах.

Условия хранения

Беречь от детей