Инструкция по применению
Липлесс МФ Таблетки 180 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обнинская химико-фармацевтическая компания
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бемпедоевая кислота
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 180 мг

Описание

Препарат Липлесс® МФ является гиполипидемическим препаратом, содержит бемпедоевую кислоту и приводит к снижению образования холестерина (ХС), тем самым устраняя гиперхолестеринемию и снижая риск развития различных заболеваний сердечно-сосудистой системы атеросклеротического генеза.

Действующее вещество

Бемпедоевая кислота

Состав

Действующим веществом является бемпедоевая кислота.Каждая таблетка, покрытая плёночной оболочкой, содержит 180 мг бемпедоевой кислоты. Прочими вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, микрокристаллическая целлюлоза тип 102, карбоксиметилкрахмал натрия, гидроксипропилцеллюлоза, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, поливиниловый спирт, титана диоксид (Е171), тальк, макрогол.Препарат Липлесс® МФ содержит лактозу.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Гиперхолестеринемия и смешанная дислипидемия.Препарат Липлесс® МФ показан для лечения взрослых пациентов с первичной гиперхолестеринемией (гетерозиготной семейной и несемейной) или смешанной дислипидемией в качестве дополнения к диете:в комбинации с ингибиторами 3-гидрокси-3-метилглутарил-кофермента А редук-тазы (статинами) или статинами, применяемыми совместно с другими гиполипидемическими препаратами у пациентов, не способных достичь целевого уровня ХСЛПНП с помощью максимально переносимой дозы статина (см. разделы 4.2., 4.3. и4.4.);в виде монотерапии или в сочетании с другими гиполипидемическими препаратами у пациентов с непереносимостью статинов или у пациентов, которым они противопоказаны.Сердечно-сосудистые заболеванияПрепарат Липлесс® МФ показан к применению у взрослых пациентов с установленным или высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза для уменьшения сердечно-сосудистого риска за счёт снижения уровня ХС-ЛПНП (в качестве дополнения к коррекции других факторов риска):у пациентов, получающих максимально переносимую дозу статина, в комбинации с эзетимибом или без него;у пациентов с непереносимостью статинов, или которым статины противопоказаны, в виде монотерапии или в сочетании с эзетимибом.Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте это лекарство в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача.При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.   Рекомендуемая дозаРекомендуемая доза препарата Липлесс® МФ составляет одну таблетку, покрытую плёночной оболочкой (180 мг), 1 раз в день.Если Вам назначено одновременное применение препарата Липлесс® МФ и симвастатина, рекомендуемая доза симвастатина будет составлять 20 мг в день. Ваш лечащий врач может увеличить дозу симвастатина до 40 мг в день в зависимости от Вашего состояния.Если у Вас серьёзные проблемы с почками или печенью лечащий врач будет контролировать Ваше состояние. Вам могут быть назначены дополнительные анализы.Внутрь, не разжевывая, проглатывая целиком.Вы можете принимать препарат Липлесс® МФ вне зависимости от приёма пищи.Суточную дозу (одну таблетку 180 мг) необходимо принимать 1 раз в день, ежедневно, примерно в одно и то же время.

Противопоказания

если у Вас аллергия на бемпедоевую кислоту или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;если Вы беременны;если Вы кормите грудью;если Вы принимаете симвастатин (лекарство из группы статинов, используемое для снижения уровня плохого холестерина в крови) в дозах более 40 мг в день.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.БеременностьПеред началом лечения следует убедиться, что Вы не беременны и используете эффективные способы контрацепции в соответствии с рекомендациями врача. Если Вы принимаете противозачаточные таблетки и страдаете от диареи или рвоты, которые длятся более 2 дней, Вы должны дополнительно использовать альтернативный метод контрацепции (например, презервативы, диафрагму). Продолжайте использовать эти средства контрацепции после исчезновения диареи или рвоты ещё в течение 7 дней.Если Вы принимаете препарат Липлесс® МФ и планируете беременность, обязательно сообщите об этом своему врачу, так как Ваше лечение необходимо изменить.ЛактацияНе принимайте препарат Липлесс® МФ, если Вы кормите грудью, потому что неизвестно, проникает ли бемпедоевая кислота в молоко. Если Вам потребуется принимать препарат Липлесс® МФ, Вы должны прекратить кормление грудью.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):снижение количества эритроцитов (анемия);повышение уровня мочевой кислоты в крови (подагра);повышение содержания мочевой кислоты в крови (гиперурикемия);изменение в анализе крови, указывающее на повреждение печени (повышение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ));боли в руках, ногах (конечностях).Нечасто (могут возникать более, чем у 1 человека из 100):снижение гемоглобина;изменение в анализе крови, указывающее на повреждение печени (повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ));изменения лабораторных показателей оценки работы почек:о   повышение уровня креатинина в крови, о   повышение уровня мочевины в крови, о   снижение скорости клубочковой фильтрации.Если у Вас возникли вышеперечисленные нежелательные реакции или появились какие-либо иные реакции, не описанные в данном листке-вкладыше, сообщите об этом своему лечащему врачу.

Передозировка

Если Вы приняли больше препарата Липлесс® МФ, чем следовало, обратитесь к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите своему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие лекарственные препараты.Особенно важно сообщить врачу, если Вы одновременно принимаете или собираетесь принимать следующие препараты:пробенецид (препарат, применяемый для лечения подагры);статины (например, симвастатин, аторвастатин, правастатин, розувастатин), которые применяются для снижения ХС в крови. При совместном применении препарата Липлесс® МФ и статинов увеличивается риск возникновения мышечного заболевания. В случае возникновения необъяснимой мышечной боли, чувствительности или слабости немедленно обратитесь ко врачу;бозентан (препарат, который применяется для лечения лёгочной артериальной гипертензии);фимасартан (применяется для лечения повышенного артериального давления и сердечной недостаточности); асунапревир, глекапревир, гразопревир, воксилапревир (используются для лечения гепатита С).

Особые указания

Перед применением препарата Липлесс® МФ проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:если у Вас когда-либо была подагра;у Вас серьёзные проблемы с почками;у Вас серьёзные проблемы с печенью.Вам могут быть назначены дополнительные анализы крови до начала приёма и во время приёма препарата Липлесс® МФ. Это необходимо чтобы контролировать Ваше состояние.