Инструкция по применению
Липоксин капсулы N30

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 2.0



Состав

Биологически активные вещества, мг/капс.: йохимбин - 1,25 - 2,5, кофеин - 75,0 (60 - 90), синефрин - не менее 5,0, салицин - не менее 15,0. Токсичные элементы (мг/кг, не более): свинец5кадмий1мышьяк3ртуть1Пестициды (мг/кг, не более): ГХЦГ (сумма изомеров)0,1ДДТ и его метаболиты0,1гептахлор, алдринне допускаютсяМикробиологические показатели: КМАФАнМ (КОЕ/г, не более)50000БГКП (колиформы) в 0,1 гне допускаютсяE.coli в 1,0 гне допускаютсяпатогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, в 10,0 гне допускаютсядрожжи и плесени (КОЕ/г, не более)100 Состав: экстракт коры ивы, экстракт померанца, кофеин, экстракт кайенского перца, экстракт коры йохимбе, Е460, Е553, Е470, Е464.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для лиц с избыточным весом, в качестве предтренировочного комплекса. Не принимать с другими стимуляторами. Перед употреблением проконсультироваться с врачем.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное артериальное давление, нарушения сердечной деятельности, выраженный атеросклероз, прием в вечернее время, выраженные нарушения функции печени и почек.

Побочные действия

Тахикардия, возбужденность бессоница, головная боль, головокружение, покраснение кожи.

Передозировка

Тошнота, рвота, мидриаз, слюноотделение, слезотечение, повышенное потовыделение, тремор.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 30 °C.