Инструкция по применению
Лирика Капсулы 75 мг 14 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: Пфайзер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Прегабалин
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 75 мг
Срок годности: 36

Описание

Лирика®, 75 мг, капсулы: твердые желатиновые капсулы № 4 с крышечкой от красно-коричневого до темно-красно-коричневого цвета и корпусом белого цвета. Черными чернилами на корпусе капсулы указаны дозировка и код продукта «PGN 75», на крышечке - «Pfizer».

Действующее вещество

Прегабалин

Состав

Препарат Лирика® **содержит:** Действующим веществом является прегабалин. Каждая капсула препарата содержи 75 мг прегабалина. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: * Лактозы моногидрат * Крахмал кукурузный * Тальк. Состав капсулы: _Корпус:_ краситель железа оксид красный (для дозировок 100 мг и 200 мг), титана диоксид, натрия лаурилсульфат, вода, желатин. _Крышечка:_ краситель железа оксид красный (для дозировок 75 мг, 100 мг, 200 мг и 300 мг), титана диоксид, натрия лаурилсульфат, вода, желатин. Состав чернил: Шеллак, этанол*, изопропанол*, бутанол*, пропиленгликоль, аммиака раствор концентрированный*, калия гидроксид, вода очищенная*, краситель железа оксид черный. * Выпаривается в процессе производства. Не содержится в конечном продукте.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Лекарственный препарат Лирика® применяется по следующим показаниям у взрослых в возрасте от 18 лет: * _Периферическая и центральная нейропатическая боль у взрослых__:_ препарат Лирика® используется для лечения боли, обусловленной поражением нервов вследствие повреждения или заболевания, например, сахарный диабет, опоясывающий лишай и др. * _Эпилепсия_: препарат Лирика® применяется для лечения определенной формы эпилепсии (с парциальными судорожными приступами со вторичной генерализацией или без нее) в качестве дополнительной терапии у взрослых. * _Генерализованное тревожное расстройство:_ препарат Лирика® применяется для лечения ГТР у взрослых. * _Фибромиалгия_: препарат Лирика® применяется для лечения фибромиалгии у взрослых.

Противопоказания

Не принимайте препарат Лирика®: * если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к прегабалину или любым другим компонентам препарата; * дети в возрасте до 18 лет.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Лирика® больше, чем следовало Если Вы случайно приняли слишком много препарата Лирика®, немедленно сообщите об этом Вашему лечащему врачу или вызовите скорую медицинскую помощь или обратитесь в ближайшее отделение экстренной медицинской помощи. Передозировка препарата может вызвать у Вас сонливость, спутанность сознания, возбуждение или беспокойство, возможно возникновение эпилепсии (судорог). В редких случаях сообщалось о коме. Лечение передозировки включает в себя общие поддерживающие меры и при необходимости может включать очищения крови с помощью аппарата «искусственная почка» (гемодиализ). Возьмите с собой упаковку препарата Лирика® или данный листок-вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли.

Условия хранения

Препарат Лирика® следует хранить при температуре не выше 25 °C. Храните препарат в недоступном для детей месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.