Инструкция по применению
Лив-52 Таблетки 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Хималайя
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Порошок корней каперсов колючих+семян цикория обыкновенного+железа оксид
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 65 мг+65 мг+33 мг+32 мг+32 мг+16 мг+16 мг+16 мг
Срок годности: 36.0

Описание

Таблетки ,зеленовато-серого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета, круглые, двояковыпуклые.

Действующее вещество

Порошок корней каперсов колючих+семян цикория обыкновенного+железа оксид

Состав

 , 1 таб. порошок корней каперсов колючих 65 мг порошок семян цикория обыкновенного 65 мг железа оксид (мандур басма) 33 мг порошок паслена черного 32 мг порошок коры терминалии арджуна 32 мг порошок семян кассии западной 16 мг порошок травы тысячелистника обыкновенного 16 мг порошок тамарикса гальского 16 мг, обработанные над паром экстракта из смеси лекарственного сырья: эклипты белой, филлантуса нирури, берхавии раскидистой, тиноспоры сердцелистной, редьки посевной, эмблики лекарственной, свинчатки цейлонской, эмболии смородиновой, терминалии хебула (миробаланового дерева), дымянки лекарственной.
Вспомогательные вещества: магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, натрия карбоксиметилцеллюлоза.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Терапевтический эффект Лив. 52 обусловлен совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

Показания

острые и хронические инфекционные, токсические и лекарственные гепатиты, цирроз печени у взрослых, жировой гепатоз, анорексия, профилактика токсических поражений печени (вызываемых антибиотиками, противотуберкулезными препаратами, жаропонижающими средствами).

Способ применения и дозы

С ,профилактической целью ,препарат назначают по 2 таб. 2 раза/сут. С ,лечебной целью ,детям старше 6 лет ,назначают по 1-2 таб. 2-3 раза/сут, ,взрослым ,- 2 - 3 таб. 2 - 3 раза/сут.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, лактация.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется принимать Лив 52 при лактации и беременности.

Побочные действия

Возможно: ,аллергические реакции, диспепсия.

Передозировка

Сведения о передозировке препарата Лив. 52 отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Лив.52 не описано.

Особые указания

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с острыми заболеваниями ЖКТ. Лив. 52 К (лекарственная форма - капли) не содержит этиловый спирт и может применяться у детей с заболеваниями печени и желчевыводящих путей.

Условия хранения

Беречь от детей