**Инструкция по применению**
**Ливолин форте капсулы N30**

## Характеристики




Форма выпуска: Капсулы
Страна: Тайланд
Производитель: МЕДИКАП
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Прочие препараты
Количество в упаковке: 30

## Описание

Капсулы ливолин форте - гепатопротектор. Активными компонентами выступают «эссенциальные» фосфолипиды, основными составляющими которых являются: фосфатидилхолин, жирные полинасыщенные кислоты (линоленовая, линолевая и олеиновая).Медикамент содержит фосфатидилхолин в виде высокоочищенной фракции, которую получают путём выделения из соевых бобов. Фракция богата жирными полинасыщенными кислотами, благодаря чему в двенадцатиперстной кишке сохраняется большая часть лекарственного средства, не подвергаясь воздействию фосфолипазы А2. Значительное количество «эссенциальных» фосфолипидов встраивается в субклеточные и клеточные мембраны после поступления в кровь.

## Действующее вещество

Поливитамины+Прочие препараты

## Состав

Каждая капсула содержит лецитин (300 мг фосфатидилхолина), мононитрат тиамина, никотинамид, цианокобаламин, ацетат токоферола, рибофлавин, гидрохлорид пиридоксина. Дополнительные компоненты: растительное безводное масло, соевое масло, белый воск. Состав капсульной оболочки: оксид железа (жёлтый, красный, чёрный), глицерин, желатин, диоксид титана и очищенная вода.

**Форма выпуска**

Капсулы

**Показания**

Гепатит токсического генеза, жировая дистрофия печени на фоне хронических инфекционных процессов, сахарного диабета, печёночный цирроз, гепатит в острой стадии, токсикоз беременных, хронический гепатит, псориаз, интоксикации, лучевая болезнь, нарушения в работе печёночной системы на фоне соматической патологии.

**Способ применения и дозы**

Капсулы Ливолин принимают 2-3 раза в сутки по 1-2 штуки. Минимальный курс лечения — 3 месяца. Решение о проведении повторного курса терапии принимает лечащий врач, опираясь на результаты первого этапа, переносимость и эффективность. Предпочтительное время приёма капсул — до еды. Производителем рекомендуется запивать капсулы водой.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Требуется консультация наблюдающего врача.

**Побочные действия**

Аллергические ответы, тошнота, эпигастральные боли, дискомфорт в области живота.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Может назначаться совместно с другими лекарственными препаратами.

**Особые указания**

Противопоказания: индивидуальная гиперчувствительность.