Инструкция по применению
Люголь Спрей для горла 12,5 мг/мл 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Йод+[Калия йодид+Глицерол]
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 12.5 мг/мл

Описание

Люголь - основным действующим веществом является молекулярный йод, оказывающий антисептический и местнораздражающий эффект. Оказывает бактерицидное действие в отношении грамотрицательной и грамположительной флоры, а также действует на патогенные грибы (в т.ч. дрожжи); Staphylococcus spp. более устойчивы к йоду, однако при длительном применении препарата в 80% случаев отмечается подавление стафилококковой флоры; Pseudomonas aeruginosa устойчива к действию препарата. При нанесении на обширные поверхности кожи и слизистых оболочек йод оказывает резорбтивное действие: участвует в синтезе Т3 и Т4. Входящий в состав калия йодид улучшает растворение йода в воде, а глицерол оказывает смягчающее действие.

Действующее вещество

Йод+[Калия йодид+Глицерол]

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

В случае применения препарата в рекомендуемых дозах, резорбция йода через кожу и слизистые оболочки полости рта незначительна. При контакте со слизистыми оболочками на 30% превращается в йодиды. При случайном проглатывании йод быстро всасывается. Адсорбированная часть хорошо проникает в ткани и органы, накапливается в тканях щитовидной железы. Выводится почками (главным образом), в меньшей степени с каловыми массами и с потом. Проникает в молоко лактирующих женщин.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и глотки у взрослых и детей.

Способ применения и дозы

Препарат применяется местно по одному нажатию 4 - 6 раз в сутки для орошения слизистой оболочки полости рта, глотки, зева. В момент впрыскивания рекомендуется задержать дыхание.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препаратам йода.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение препарата при беременности. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможно развитие явлений йодизма: насморк, кожные высыпания по типу крапивницы, слюнотечение, слезотечение, контактный дерматит, эритема, сухость кожи, легкое жжение, зуд, бронхоспазм, тошнота, рвота, отек Квинке (у некоторых пациентов из-за запаха препарата), покраснение на месте аппликации.

Передозировка

Симптомы: раздражите верхних дыхательных путей (ожог, ларингобронхоспазм), при попадании внутрь - слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, развитие гемолиза, гемоглобинурии, смертельная доза - около 3 г (около 300 мл препарата). Лечение: промывание желудка 0.5% раствором натрия тиосульфата, растворанатрия гидрокарбоната, в/в вводится натрия тиосульфат 30% - до 300 мл.

Взаимодействие с другими препаратами

Йод инактивируется натрия тиосульфатом. Содержащийся в составе препарата йод окисляет металлы, что может приводить к порче металлических предметов. Фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака. Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность.