Инструкция по применению
Лютрин Капсулы 538 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Румыния
Производитель: К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 3.0



Описание

БАД - источник витаминов, минеральных веществ и каротиноидов

Состав

Витамин С (аскорбиновая кислота) 60 мг, витамин В1 (тиамина мононитрат) 1.5 мг, витамин В2 (рибофлавин) 3 мг, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 2 мг, витамин Е (DL-токоферола ацетат 50%) 20 мг, витамин А (ретинола ацетат) 1 мг, цинка оксид 12.44 мг, что соответствует содержанию цинка 10 мг, натрия селенит 4.27 мг, что соответствует содержанию селена 0.0195 мг, хрома пиколинат 0.40 мг, что соответствует содержанию хрома 0.05 мг, меди сульфат 1 мг, что соответствует содержанию меди 0.375 мг, водно-спиртовой экстракт цветов бархатцев (5:1) 60 мг, что соответствует содержанию лютеина 6 мг, что соответствует содержанию зеаксантина 3 мг, экстракт черники 60 мг. Вспомогательные вещества: мальтодекстрин 134.37 мг, целлюлоза микрокристаллическая (носитель, E460i) - 75 мг, магния стеарат (агент антислеживающий, E470b) - 5 мг, кремний коллоидный безводный (агент антислеживающий, E551) - 2 мг. Состав оболочки капсулы: желатин, титана диоксид (краситель, E171), железа оксид красный (краситель, E172), железа оксид черный (краситель, E172), вода очищенная.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов (A, E, C, B1, B2, B6), минеральных веществ (хрома, меди, селена, цинка), каротиноидов (лютеина, зеаксантина): при повышенных зрительных нагрузках и использовании контактных линз для профилактики осложнений при длительном использовании контактных линз при длительном вождении при сложностях /отсутствии адаптации зрения к недостаточной освещенности при возрастных изменениях сетчатки, дегенеративных процессах в комплексном лечении катаракты для лечения и профилактики ретинопатии у пациентов, страдающих сахарным диабетом для профилактики возрастной катаракты, сенильной макулодистрофии в восстановительном периоде после офтальмологических операций. Способствует улучшению остроты зрения, в частности при возрастных изменениях.

Способ применения и дозы

Лютрин принимают внутрь во время приема пищи, запивая достаточным количеством жидкости. Пациентам, которые не могут проглотить капсулу, необходимо вскрыть капсулу, содержимое высыпать в ложку и смешать с небольшим количеством жидкости. Взрослым назначают по 1 капсула 1 раз в сутки. Рекомендуемая длительность курса 1 месяц.

Противопоказания

Беременность, период лактации (грудного вскармливания), индивидуальная непереносимость компонентов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Особые указания

Лютрин является биологически активной добавкой к пище и не должен заменять разнообразную, сбалансированную диету и здоровый образ жизни. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не следует превышать рекомендуемую дозу. Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет из-за содержания рибофлавина, что не имеет клинического значения. Чтобы избежать передозировки, не рекомендуется принимать одновременно с другими препаратами, которые содержат витаминные комплексы.

Условия хранения

Хранить в обычных условиях, в недоступном для детей месте.