Инструкция по применению
Лоцерил Лак для ногтей против грибка 5 % 5 мл

Характеристики



Форма выпуска: Лак
Страна: Франция
Производитель: Галдерма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аморолфин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%
Срок годности: 36.0

Описание

Лак от грибка Лоцерил® — лекарственный препарат, который обладает широким спектром действия, он активно борется как с наиболее распространенными, так и с редкими видами возбудителей грибка ногтей.[1] Противогрибковый лак для ногтей Лоцерил® образует водонепроницаемую полимерную пленку на поверхности ногтя, которая не смывается в душе, не стирается в обуви при ходьбе, тем самым обеспечивается постоянное действие препарата. Действующее вещество препарата Лоцерил® аморолфин проникает глубоко в ногтевую пластинку и далее в ногтевое ложе, уничтожая грибок даже в труднодоступных местах. Наносить лак против грибка ногтей Лоцерил® можно 1 раза в неделю*, что удобно, ведь для достижения результата нужно четко придерживаться схемы лечения[1]. Лоцерил® — противогрибковое средство для ногтей на основе аморолфина. Препарат оказывает тройной эффект: проникает глубоко в ноготь вплоть до ногтевого ложа, находит очаги заражения и уничтожает распространенные и редкие виды патогенных грибков, а также защищает ноготь от повторного заражения. Средство от грибка Лоцерил® выпускается в виде лака для ногтей. Такой формат удобен в нанесении и обладает рядом преимуществ: • Лак для ногтей является водостойким. Он не смывается в душе, ванной, в бассейне, а также не стирается в обуви. Благодаря этому активное вещество препарата действует без перерывов. • Средство от грибка ногтей на ногах достаточно наносить один раз в неделю. Лак прочно фиксируется на ногте, что обеспечивает длительное и постоянное лечебное действие. • Удобный аппликатор, встроенный в крышку флакона, позволяет равномерно покрыть весь ноготь, за счет чего препарат работает по всей длине и в толще ногтя. • Средство от грибка ногтей можно наносить под обычный косметический лак, что позволяет сохранить эстетичный внешний вид рук и стоп, а также скрыть проблему от окружающих. Одной упаковки противогрибкового лака Лоцерил® хватает на весь курс лечения, поэтому вам не придется докупать препарат каждые две-три недели. В комплект входит все необходимое для лечения грибка: спиртовые салфетки, одноразовые пилки для ногтей и лак для ногтей Лоцерил® с удобным аппликатором.

Действующее вещество

Аморолфин

Состав

В 1,0 г препарата содержится: Действующее вещество: аморолфина гидрохлорид - 64,0 мг, что соответствует аморолфина основанию- 57,4 мг. Вспомогательные вещества: метилметакрилата, триметиламмониоэтилметакрилата хлорида и этилакрилата сополимер [1:2:0.2] - 143,0 мг, триацетин - 12,0 мг, бутилацетат - 57,0 мг, этилацетат - 172,0 мг, этанол абсолютный - 552,0 мг.

Форма выпуска

Лак

Фармакокинетика

При нанесении на ногти проникает в ногтевую пластинку и далее в ногтевое ложе (практически полностью в течение первых 24 часов). Эффективная концентрация сохраняется в пораженной ногтевой пластинке в течение 7-10 дней уже после первой аппликации. Системная абсорбция незначительна: концентрация в плазме находится ниже предела чувствительности методов определения (менее 0,5 нг/мл).

Показания

Лечение грибковых поражений ногтей, вызванных дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами; профилактика грибковых поражений ногтей.

Способ применения и дозы

Наружно. Наносить на поражённые ногти пальцев рук или ног 1-2 раза в неделю следующим образом: 1\. До применения препарата удалить по возможности поражённые участки ногтя (особенно на его поверхности) с помощью прилагаемой пилки для ногтей. 2\. Затем поверхность ногтя очистить и обезжирить прилагаемым тампоном, смоченным спиртом. Обработку ногтей пилкой и тампоном со спиртом необходимо проводить перед каждым применением препарата. 3\. Опустить встроенный апликатор во флакон с лаком и затем аккуратно вынуть его, не стирая излишки лака о горлышко флакона. 4\. С помощью апликатора нанести лак ровным слоем на всю поверхность пораженного ногтя. Вышеописанную процедуру повторить для каждого поражённого ногтя. 5\. Дать лаку высохнуть в течение 3-х минут. 6\. Протереть апликатор тампоном, использованным для очистки ногтя, избегая при этом контакта обработанных ногтей и тампона. Плотно закрыть флакон сразу же после использования. Нанесение декоративного лака для ногтей возможно не ранее чем через 10 минут после применения лекарственного лака для ногтей Лоцерил. При повторном применении лака Лоцерил, необходимо аккуратно удалить с ногтей оставшийся декоративный лак, затем с помощью прилагаемых пилок обработать пораженные участки ногтей и удалить оставшийся слой лака спиртовыми тампонами. По окончании процедуры тщательно вымойте руки. В случае, если лак наносился на ногти на руках, дождитесь сначала его полного высыхания. После высыхания лака разрешается регулярное мытье рук и ног с использованием мыла. Лечение следует продолжать до регенерации ногтя и полного излечения пораженного участка. Средняя длительность лечения составляет 6 месяцев для ногтей на руках и 9-12 месяцев для ногтей на ногах. Ввиду медленного роста ногтевых пластин первые признаки улучшения могут стать заметными только после 2-3 месяцев применения препарата. При отсутствии признаков улучшения по истечении 3 месяцев рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к аморолфину или любому из компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о применении аморолфина при беременности и/или в период грудного вскармливания ограничены. Исследования на животных показали наличие репродуктивной токсичности при преоральном применении препарата в высоких дозах. Ввиду крайне низкого системного воздействия аморолфина при его наружном применении в форме лака для ногтей степень риска для плода незначительная . Неизвестно, проникает ли аморолфин в грудное молоко. Ввиду незначительности данных о применении аморолфина у беременных и кормящих женщин, применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется.

Побочные действия

При наружном применении препарата развитие системных признаков передозировки не ожидается. При случайном проглатывании препарата необходимо провести соответствующую симптоматическую терапию.

Передозировка

При случайном проглатывании препарата необходимо провести соответствующую симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Не установлено.

Особые указания

• Пилки, использованные для обработки пораженных ногтей, не следует использовать для обработки здоровых ногтей; • Лица, работающие с органическими растворителями, должны надевать непроницаемые перчатки для защиты ногтей, покрытых лаком; • Во время лечения следует избегать использования накладных искусственных ногтей; • Препарат содержит этанол, поэтому слишком частое или неправильное его нанесение может привести к появлению раздражения или сухости кожи вокруг ногтя; • Тампон содержит легко воспламеняющееся вещество. Следует избегать попадания лака в глаза, уши и на слизистые оболочки. При попадании лака в глаза необходимо немедленно промыть их водой. Пациентам с состояниями, предрасполагающими к развитию грибковых поражений ногтей (нарушение периферического кровообращения, сахарный диабет, иммунодефициты), а также пациентам с дистрофией ногтя или разрушенной ногтевой пластинкой, псориазом или другими хроническими заболеваниями кожи следует обратиться к врачу. В случае, если разрушению или грибковому поражению подвержено более 2/3 ногтевой пластинки, необходимо также обратиться к врачу для назначения сопутствующей пероральной терапии. При возникновении системных или местных аллергических реакций после нанесения лака Лоцерил® следует немедленно прекратить его применение и обратиться к врачу. Используя жидкость для снятия лака, необходимо удалить препарат с ногтей. Не следует наносить препарат повторно.

Условия хранения

В сухом месте