
Инструкция по применению
Локоид Липокрем Крем для наружного применения 0,1 % 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: ЛЕО ФАРМА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гидрокортизона 17-бутират
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,1%
Срок годности: 36



Действующее вещество

Гидрокортизона 17-бутират

Состав

1 г гидрокортизона бутират 1 мг. Вспомогательные вещества: цетостеариловый спирт 72 мг, макрогол 25 цетостеариловый эфир 18 мг, парафин жидкий 60 мг, парафин белый мягкий 150 мг, пропилпарагидроксибензоат 1 мг, бутилпарагидроксибензоат 0.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

Всасывание: После аппликации происходит накопление активного вещества в эпидермисе, в основном в зернистом слое, системная абсорбция незначительна. Небольшое количество гидрокортизона 17-бутирата всасывается в системный кровоток в неизмененном виде. Метаболизм: Большая часть гидрокортизона 17-бутирата метаболизируется до гидрокортизона и других метаболитов непосредственно в эпидермисе и в последующем в печени. Выведение: Метаболиты и незначительная часть неизмененного гидрокортизона 17-бутирата выводится почками и через кишечник.

Показания

Поверхностные, неинфицированные, чувствительные к местным глюкокортикостероидам заболевания кожи: — дерматиты, в том числе атопический, контактный, себорейный — экзема — псориаз.

Способ применения и дозы

Наружно. Локоид крем предпочтительно применять при острых и подострых кожных процессах (без мокнутия). Препарат наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 1-3 раза/сут. Для улучшения проникновения препарат наносят легкими массирующими движениями. При появлении положительной динамики кратность применения препарата можно уменьшить до 2-3 раз в неделю. Доза препарата, используемая в течение недели, не должна превышать 30-60 г.

Противопоказания

— гиперчувствительность к гидрокортизону или вспомогательным компонентам препарата — бактериальные инфекции кожи (стрепто- и стафилодермии, грамотрицательный фолликулит и т.д.) — вирусные инфекции кожи (простой герпес, ветряная оспа, опоясывающий лишай и т.д.) — грибковые инфекции кожи — туберкулезные и сифилитические поражения кожи — паразитарные инфекции кожи — неопластические изменения кожи (доброкачественные и злокачественные опухоли) — акне, розацеа, периоральный дерматит — поствакцинальный период — нарушение целостности кожных покровов (раны, язвы). С осторожностью: беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применять с осторожностью при беременности, в период лактации. Глюкокортикостероиды проникают через плаценту. Воздействие на плод может быть особенно выраженным при нанесении препарата на большие поверхности. Нет данных о количестве гидрокортизона, выделяющегося с грудным молоком; рекомендуется соблюдать особую осторожность при назначении препарата в период лактации.

Побочные действия

Местные реакции: раздражение кожи, в редких случаях - другие местные реакции, характерные для наружной стероидной терапии. Системные реакции: при длительном применении, нанесении на большие поверхности и/или использовании окклюзии могут наблюдаться побочные эффекты, характерные для системных глюкокортикостероидов. Риск возникновения местных и системных побочных эффектов при применении Локоида ниже, чем при использовании фторированных стероидов.

Передозировка

Данных о передозировке Локоида нет. При длительном применении препарата в высоких дозах возможно усиление описанных выше побочных эффектов. При появлении симптомов гиперкортицизма препарат следует отменить.

Взаимодействие с другими препаратами

Данных о лекарственных взаимодействиях Локоида нет.

Особые указания

Не следует наносить Локоид на периорбитальную область в связи с риском развития глаукомы. При систематическом попадании на конъюнктиву возникает риск увеличения внутриглазного давления. При локализации процесса на волосистой части головы и при экссудативном воспалении предпочтительно использовать Локоид в форме Крело. В случаях резистентного течения заболеваний, например, при локализации плотных псориатических бляшек на локтевых областях, коленях, выраженной лихенификации, сухости лучше отдавать предпочтение Локоиду в форме мази или Липокрема, в случае необходимости - под окклюзионными повязками. Препарат не желательно использовать при наличии атрофических изменений кожи. Риск возникновения местных и системных побочных эффектов увеличивается при нанесении на обширные участки поражения, длительном применении, использовании окклюзии и в детском возрасте. При отсутствии эффекта в течение 2-х недель непрерывного лечения, следует уточнить диагноз. Как и при использовании любого глюкокортикостероидного препарата, желательно ограничивать продолжительность применения и курсовую дозу минимально достаточной для купирования кожного процесса. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами Данных о влиянии Локоида на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами нет.

Условия хранения

В сухом месте